



Ministério da Educação  
**Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Curitiba**  
*Departamento Acadêmico de Matemática*

# EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

Notas de aula

Professor: Altemir José Borges

Curitiba  
Agosto de 2006

# EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

**Definição:** Chama-se equação diferencial à equação que possui as derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes, em relação a uma ou mais variáveis livres.

Exemplos:

$$a) \frac{dy}{dx} = 3x - 1$$

$$b) \frac{d^2y}{dx^2} - 7 \frac{dy}{dx} + 12y = 6e^{5x}$$

$$c) \left( \frac{d^2y}{dx^2} \right)^3 - 5 \left( \frac{dy}{dx} \right)^4 = \cos x$$

$$d) \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 3xyz$$

**Classificação:** A equação será chamada de ordinária se as variáveis dependentes forem função de uma única variável livre, caso contrário, serão chamadas de equações diferenciais parciais. As equações dos exemplos a, b e c anteriores são equações diferenciais ordinárias e a equação do exemplo d é uma equação diferencial parcial.

**Ordem:** Chama-se ordem de uma equação diferencial à ordem da derivada de maior ordem. As equações a) e d) são de primeira ordem, já os exemplos b) e c) são de segunda ordem.

**Grau:** Grau é o maior expoente da derivada de maior ordem. As equações a, b e d são de primeiro grau e o exemplo c é do terceiro grau.

**Solução:** É uma função que quando substituída na equação diferencial a transforma numa identidade. As soluções podem ser: solução geral, particular ou singular.

Chama-se solução geral à família de curvas integrais que verifica a equação diferencial e possui constantes arbitrárias.

Chama-se solução particular de uma equação diferencial à solução obtida a partir da solução geral impondo condições iniciais ou de contorno. Geralmente as condições iniciais serão dadas para o instante inicial, já as condições de contorno aparecem quando nas equações de ordem superior os valores da função e de suas derivadas são dadas em pontos distintos. Por exemplo: Resolver a equação diferencial ordinária (EDO)  $5y'' + y' = -6x$ , sujeita às condições iniciais  $y(0) = 2$  e  $y'(0) = 3$ , ou resolver a EDO  $5y'' + y' = -6x$ , sujeita às condições de contorno  $y(0) = 2$  e  $y'(1) = 3$ .

Chama-se solução singular de uma equação diferencial à envoltória<sup>1</sup> da família de curvas integrais.

**Teorema da existência:** A equação  $\frac{dy}{dx} = g(x, y)$  admite solução se:

- $g(x, y)$  é contínua e unívoca em uma região D de pontos  $(x, y)$ .
- $\partial g / \partial y$  existe e é contínua em todos os pontos de D.

<sup>1</sup> Envoltória de uma família de curvas é a uma curva tangente a todas as curvas da família.

Exercícios:

1. Mostre, por substituição, que as seguintes funções são soluções das equações diferenciais dadas:

a)  $y = e^{2x}$ ,  $y'' - 5y' + 6y = 0$

b)  $y = e^{3x}$ ,  $y'' - 5y' + 6y = 0$

c)  $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$ ,  $y'' - 5y' + 6y = 0$

d)  $y = Ax + Bx^2 - 3x \ln x$ ,  $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 3x$

e)  $y = Ax + Bx \ln x + 2 + \ln x$ ,  $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = \ln x$

2. Determine uma equação diferencial de menor ordem possível que não contenha constantes arbitrárias e que possua as seguintes soluções:

a)  $y = Cx^2$

b)  $y = C_1 x^2 + C_2$

c)  $y = A \sin 2x + B \cos 2x$

d)  $y = Ae^x + Be^{2x}$

e)  $\ln \frac{x}{y} = 1 + Cy$

f)  $x^3 = C(x^2 - y^2)$

g)  $\operatorname{cosec}(x+y) - \cot g(x+y) = x + C$

3. Encontre uma equação diferencial da família de circunferências de raio 5 e de centros sobre o eixo dos x.

4. Nas equações diferenciais a seguir, substitua  $y = e^{rx}$  para determinar todos os valores de r para os quais  $y = e^{rx}$  é uma solução da equação.

a)  $3y' = 2y$

b)  $4y'' = y$

c)  $y'' + y' - 2y = 0$

d)  $3y'' + 3y' - 4y = 0$

e)  $y'' - 4y' + 8y = 0$

5. Nos exercícios seguintes, uma função  $y=g(x)$  é descrita por alguma propriedade geométrica de seu gráfico. Escreva uma equação diferencial da forma  $y'=f(x,y)$ , tendo a função  $y=g(x)$  como solução:

a) A inclinação (declividade) do gráfico de g no ponto  $(x,y)$  é a soma de x e y.

b) A reta tangente ao gráfico de g no ponto  $(x,y)$  intercepta o eixo dos x em  $(x/2,0)$ .

c) Cada reta normal ao gráfico de g passa pelo ponto  $(0,1)$ .

d) A reta tangente ao gráfico de g em  $(x,y)$  passa pelo ponto  $(-y,x)$ .

## EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE 1ª ORDEM E 1º GRAU:

Neste estudo vamos dividir as equações de 1ª ordem e 1º grau, para um melhor entendimento, em alguns tipos.

### 1º TIPO: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE VARIÁVEIS SEPARÁVEIS

A equação de 1ª ordem e 1º grau  $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$  será de variáveis separáveis se:

- M e N forem funções de apenas uma variável ou constantes.
- M e N forem produtos de fatores de uma só variável.

#### Resolução:

Para resolvermos tal tipo de equação diferencial, como o próprio nome já diz, deveremos separar as variáveis, isto é, deveremos deixar o coeficiente da diferencial dx como sendo uma função exclusiva da variável x e o coeficiente da diferencial dy como sendo uma função exclusiva da variável y, e então integrarmos cada diferencial.

#### Exemplo:

Determine a solução geral da equação diferencial  $\frac{dy}{dx} = 3y \cos x$

#### Solução:

Primeiramente devemos escrever a EDO na forma de uma diferencial.

$$dy = 3y \cos x dx$$

Vamos determinar um fator integrante<sup>2</sup> que separe as variáveis, que será:

$$FI = \frac{1}{y}$$

Multiplicando ambos os membros da equação pelo fator integrante, vem:

$$\frac{dy}{y} = 3 \cos x dx$$

Integrando ambos os membros, teremos:

$$\int \frac{dy}{y} = \int 3 \cos x dx$$

$$\ln y = 3 \sin x + C$$

$$y = C_1 e^{3 \sin x}$$

Resolva as seguintes equações diferenciais, por separação de variáveis.

1.  $\frac{dy}{dx} = 3x - 1$

2.  $y dx - x dy = 0$

3.  $x dx - \frac{\sqrt{4-x}}{y} dy = 0$

4.  $\operatorname{tg} x \cdot \sec y dx - \operatorname{tgy} \cdot \sec x dy = 0$

<sup>2</sup> Fator integrante é um fator que quando multiplicado em ambos os membros da equação separará as variáveis ou transformará a equação num modelo conhecido.

$$5. (x^2 - 1)\sqrt{1 - y^2} dx - x^2 dy = 0$$

$$6. (x - 1)dy - ydx = 0$$

$$7. \frac{dy}{dx} = \frac{1 + y^2}{1 + x^2}$$

$$8. \frac{dy}{dx} = \text{sen } 5x$$

$$9. dx + e^{3x} dy = 0$$

$$10. (x + 1)\frac{dy}{dx} = x + 6$$

$$11. xy' = 4y$$

$$12. \frac{dy}{dx} = \frac{y^3}{x^2}$$

$$13. \frac{dx}{dy} = \frac{x^2 y^2}{1 + x}$$

$$14. \frac{dy}{dx} = e^{3x+2y}$$

$$15. (4y + yx^2)dy - (2x + xy^2)dx = 0$$

$$16. 2y(x + 1)dy = xdx$$

$$17. y \ln x \frac{dx}{dy} = \left(\frac{y+1}{x}\right)^2$$

$$18. (e^{-y} + 1)\text{sen } x dx = (1 + \cos x)dy, \text{ com } y(0) = 0$$

$$19. ydy = 4x(y^2 + 1)^{1/2} dx, \text{ com } y(0) = 1$$

$$20. \frac{dx}{dy} = 4(x^2 + 1), \text{ com } x(\pi/4) = 1$$

$$21. x^2 y' = y - xy, \text{ com } y(-1) = -1$$

$$22. (e^x + e^{-x})\frac{dy}{dx} = y^2$$

$$23. \frac{dp}{dt} = p - p^2$$

$$24. \frac{dy}{dx} = 1 + x + y + xy$$

$$25. \frac{dy}{dx} = xy + x - 2y - 2, \text{ com } y(0) = 2$$

$$26. \cos y dx + (1 + e^{-x})\text{sen } y dy = 0, \text{ com } y(0) = \pi/4$$

$$27. \frac{dy}{dx} = \frac{10}{x^2 + 1}, \text{ com } y(0) = 0$$

$$28. \frac{dy}{dx} = \cos(x + y) \text{ (Dica: Faça } x + y = t)$$

$$29. y' = (x + y + 1)^2 \text{ (Dica observe o ex. 28)}$$

30.  $y' = tg^2(x+y)$  (Dica observe o ex. 28)

31.  $y' = 2 + \sqrt{y - 2x + 3}$  (Dica observe o ex. 28)

32. Encontre as soluções singulares da equação  $x\sqrt{1-y^2}dx = dy$

**RESPOSTAS**

1.  $\frac{3x^2}{2} - x - y = C$

2.  $\frac{x}{y} = C$

3.  $-24\sqrt{4-x} + 2\sqrt{(4-x)^3} - 3\ln y = C$

4.  $-\cos x + \cos y = C$

5.  $x + \frac{1}{x} - \arcsen y = C$

6.  $y = C(x-1)$

7.  $y = \frac{x+C}{1-Cx}$

8.  $y = -\frac{1}{5}\cos 5x + C$

9.  $y = \frac{1}{3}e^{-3x} + C$

10.  $y = x + 5\ln(x+1) + C$

11.  $y = Cx^4$

12.  $y^{-2} = 2x^{-1} + C$

13.  $-3 + 3x\ln(x) = xy^3 + Cx$

14.  $-3e^{-2y} = 2e^{3x} + C$

15.  $2 + y^2 = C(4 + x^2)$

16.  $y^2 = x - \ln(x+1) + C$

17.  $\frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9} = \frac{y^2}{2} + 2y + \ln y + C$

18.  $(1 + \cos x)(1 + e^y) = 4$

19.  $\sqrt{y^2 + 1} = 2x^2 + \sqrt{2}$

20.  $x = tg\left(4y - \frac{3\pi}{4}\right)$

21.  $xy = e^{-(1+1/x)}$

22.  $-y^{-1} = tg^{-1}(e^x) + C$

23.  $\frac{P}{1-p} = Ce^t$

24.  $\ln(1+y) + x + \frac{x^2}{2} + C$

25.  $y = 3e^{x^2/2 - 2x} - 1$

26.  $(1 + e^x)\sec y = 2\sqrt{2}$

27.  $y = 10\arctg x$

28.  $\operatorname{cosec}(x+y) - \cot(x+y) = x + C$

29.  $y = -x - 1 + tg(x+C)$

30.  $2y - 2x + \operatorname{sen} 2(x+y) = C$

31.  $4(y - 2x + 3) = (x + C)^2$

32.  $y=1$  ou  $y=-1$

**2º TIPO: EQUAÇÕES HOMOGÊNEAS**

**Definição:** A função definida por  $z=f(x,y)$  será uma função homogênea de grau  $m$  se tivermos  $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^m f(x,y)$ .

**Exemplos:**

a)  $f(x,y) = 2x^3 + 5xy^2$  é homogênea de grau 3, pois  $f(\lambda x, \lambda y) = 2(\lambda x)^3 + 5\lambda x \cdot (\lambda y)^2 = \lambda^3 f(x,y)$ .

b)  $f(x,y) = ye^{x/y}$  é homogênea de grau 1, pois  $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda ye^{\lambda x/\lambda y} = \lambda f(x,y)$ .

**Definição:** A equação  $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$  será chamada de equação diferencial homogênea se  $M$  e  $N$  forem funções homogêneas de mesmo grau.

**Resolução:**

Se  $Mdx + Ndy = 0$  for uma equação diferencial homogênea, então ela poderá ser escrita da forma  $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$ , onde a mudança de variáveis  $t = \frac{y}{x}$  irá separar as variáveis.

**Exemplo:**

Determine a solução de  $(2x^2 - 3y^2)dx - 6xydy = 0$ , sujeita à condição inicial  $y(1)=1/3$ .

Como as funções  $M(x,y)=2x^2-3y^2$  e  $N(x,y)=-6xy$  são funções homogêneas de grau 2, então a equação dada é homogênea.

Fazendo  $t = \frac{y}{x}$ , ou  $y=x.t$  (1) e diferenciando, teremos  $dy=x.dt+t.dx$  (2). Substituindo (1) e (2) na equação dada vem:

$$(2x^2 - 3(xt)^2)dx - 6x.xt.(t.dx + x.dt) = 0$$

$$x^2(2 - 3t^2)dx - 6x^2.t(t.dx + x.dt) = 0$$

$$(2 - 3t^2 - 6t^2)dx - 6.tx.dt = 0$$

$$(2 - 9t^2)dx - 6.tx.dt = 0$$

$$\text{Separando as variáveis, resulta: } \frac{dx}{x} - \frac{6t.dt}{2 - 9t^2} = 0.$$

$$\text{Integrando teremos } 3 \ln x + \ln(2 - 9t^2) = C$$

$$\text{Eliminando os logaritmos } x^3.(2 - 9t^2) = C$$

$$\text{Voltando para as variáveis } x \text{ e } y: x^3 \cdot \left[ 2 - 9\left(\frac{y}{x}\right)^2 \right] = C$$

$$2x^3 - 9xy^2 = C$$

Impondo a condição inicial  $y(1)=1/3$ , teremos a solução particular:

$$2x^3 - 9xy^2 = 1$$

**Resolva as seguintes equações:**

1)  $(x^2 - y^2)dx - 2xydy = 0$

2)  $(2x - y)dx - (x + 4y)dy = 0$

3)  $(x^2 + y^2)dx - xydy = 0$

4)  $(x^2 - 3y^2)dx + 2xydy = 0$ , com  $y=1$  e  $x=2$

5)  $(x - y)dx + xdy = 0$

6)  $x dx + (y - 2x)dy = 0$

7)  $(y^2 + yx)dx - x^2dy = 0$

8)  $\frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{y + x}$

9)  $-ydx + (x + \sqrt{xy})dy = 0$

10)  $2x^2ydx = (3x^3 + y^3)dy$

11)  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$

12)  $y \frac{dx}{dy} = x + 4ye^{-2x/y}$

$$13) \left( y + x \cot g \frac{y}{x} \right) dx - x dy = 0$$

$$14) (x^2 + xy - y^2) dx + xy dy = 0$$

$$15) xy^2 \frac{dy}{dx} = y^3 - x^3 \quad , \quad y(1) = 2$$

$$16) 2x^2 \frac{dy}{dx} = 3xy + y^2 \quad , \quad y(1) = -2$$

$$17) (x + ye^{y/x}) dx - xe^{y/x} dy = 0 \quad , \quad y(1) = 0$$

$$18) (y^2 + 3xy) dx = (4x^2 + xy) dy \quad , \quad y(1) = 1$$

$$19) (x + \sqrt{xy}) \frac{dy}{dx} + x - y = x^{-1/2} y^{3/2} \quad , \quad y(1) = 1$$

$$20) y^2 dx + (x^2 + xy + y^2) dy = 0 \quad , \quad y(0) = 1$$

$$21) (x + \sqrt{y^2 - xy}) \frac{dy}{dx} = y \quad , \quad y\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

### 3º TIPO: EQUAÇÕES REDUTÍVEIS A HOMOGÊNEAS OU A EQUAÇÕES DE VARIÁVEIS SEPARÁVEIS

São as equações que mediante determinada troca de variáveis se transformam em equações homogêneas ou em equações de variáveis separáveis.

#### Exemplos:

Resolver as seguintes equações diferenciais:

$$a) (x - 3y - 3) dx - (2x - 6y + 1) dy = 0$$

Observemos que a equação acima não é de variáveis separáveis porque temos uma soma das variáveis  $x$  e  $y$  e também não é homogênea pela existência de termos independentes, portanto deveremos eliminar ou a soma ou o termo independente.

Analisando as somas das variáveis, vemos que  $2x - 6y$  é proporcional a  $x - 3y$ , logo se fizermos  $x - 3y = t$  as duas somas deixarão de existir. Assim:

$$x - 3y = t \quad (1)$$

Diferenciando (1), teremos:  $dx - 3dy = dt$ , ou

$$dx = dt + 3dy \quad (2)$$

Substituindo (1) e (2) na equação dada, teremos:

$$(t - 3)(dt + 3dy) - (2t + 1)dy = 0$$

Separando as variáveis:

$$\frac{t - 3}{t - 10} dt + dy = 0$$

Integrando:

$$t + 7 \ln(t - 10) + y = C$$

Voltando para as variáveis  $x$  e  $y$ , teremos a solução geral:

$$x - 2y + 7 \ln(x - 3y - 10) = C$$


$$b) \frac{dy}{dx} = \frac{x - 3y - 1}{3x + 4y - 2}$$

Escrevendo a equação diferencial na forma de uma diferencial, teremos:

$$(x - 3y - 1)dx - (3x + 4y - 2)dy = 0$$

Observemos novamente que a equação acima não é de variáveis separáveis porque temos uma soma das variáveis  $x$  e  $y$  e também não é homogênea pela existência de termos independentes, portanto deveremos eliminar ou a soma ou o termo independente.

Como as somas  $x-3y$  e  $3x+4y$  não são proporcionais, não é possível eliminar estas somas simultaneamente. Logo deveremos eliminar os termos independentes e transformar a equação em homogênea, que equivale a efetuar uma translação de eixos.



Determinando a solução do sistema de equações  $\begin{cases} x - 3y - 1 = 0 \\ 3x + 4y - 2 = 0 \end{cases}$  obteremos as coordenadas do ponto P, que são  $P\left(\frac{10}{13}, -\frac{1}{13}\right)$ . Logo a translação  $\begin{cases} x = \frac{10}{13} + u \\ y = -\frac{1}{13} + v \end{cases}$  irá eliminar os termos independentes.

Substituindo as fórmulas de translação e suas respectivas diferenciais na equação diferencial teremos:

$$\left(\frac{10}{13} + u - 3\left(-\frac{1}{13} + v\right) - 1\right)du - \left(3\left(\frac{10}{13} + u\right) + 4\left(-\frac{1}{13} + v\right) - 2\right)dv = 0$$

Reduzindo os termos semelhantes, vem:

$$(u - 3v)du - (3u + 4v)dv = 0, \text{ que é homogênea, cuja solução é:}$$

$$x^2 - 4y^2 - 6xy - 2x + 4y = C$$

**Resolver as seguintes equações através de uma mudança adequada de variáveis:**

$$22) \frac{dy}{dx} = \frac{2x - 3y - 1}{3x + y - 2}$$

$$23) (2x - 3y)dx - (3x - y - 1)dy = 0$$

$$24) (x + 2y - 4)dx - (2x + y - 5)dy = 0$$

$$25) \frac{dy}{dx} = \frac{2x - y + 1}{6x - 3y - 1}$$

$$26) (2x + 3y - 1)dx + (2x + 3y + 2)dy = 0$$

$$27) \frac{dy}{dx} = \frac{1 - 3x - 3y}{1 + x + y}$$

$$28) (2x - y + 4)dy + (x - 2y + 5)dx = 0$$

$$29) \frac{dy}{dx} = \frac{x + 2y + 1}{2x + 4y + 3}$$

$$30) (x - 4y - 3)dx - (x - 6y - 5)dy = 0$$

$$31) (3x - y + 2)dx + (9x - 3y + 1)dy = 0$$

### RESPOSTAS

$$1. x^3 - 3xy^2 = C$$

$$2. 2x^2 - 2xy - 4y^2 = C$$

$$3. x^2 = Ce^{y^2/x^2}$$

$$4. \frac{y}{x} = \sqrt{1 - \frac{3x}{8}}$$

$$5. x \ln x + y = Cx$$

$$6. (x - y) \ln(x - y) = y + C(x - y)$$

$$7. x + y \ln x = Cy$$

$$8. \ln(x^2 + y^2) + 2tg^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = C$$

$$9. 4x = y(\ln y - C)^2$$

$$10. y^9 = C(x^3 + y^3)^2$$

$$11. \left(\frac{y}{x}\right)^2 = 2 \ln y + C$$

$$12. e^{2x/y} = 8 \ln y + C$$

$$13. x \cos\left(\frac{y}{x}\right) = C$$

$$14. y + x = Cx^2 e^{y/x}$$

$$15. y^3 + 3x^3 \ln x = 8x^3$$

$$16. x^{3/2} + yx^{1/2} = \frac{y}{2}$$

$$17. \ln x = e^{y/x} - 1$$

$$18. 4x \ln \frac{y}{x} + x \ln x + y - x = 0$$

$$19. 3x^{3/2} \ln x + 3x^{1/2} y + 2y^{3/2} = 5x^{3/2}$$

$$20. (x + y) \ln y + x = 0$$

$$21. \ln y = -2\left(1 - \frac{x}{y}\right)^{1/2} + \sqrt{2}$$

$$22. 2x^2 - 6xy - y^2 - 2x + 4y = C$$

$$23. 2x^2 - 6xy + y^2 + 2y = C$$

$$24. (x - y - 1)^3 = C(x + y - 3)$$

$$25. 5x - 15y + 4 \ln(10x - 5y - 3) = C$$

$$26. 3x + 3y = -9 \ln(2x + 3y - 7) + C$$

$$27. 3x + y + 2 \ln(-3x - 3y + 3) = C$$

$$28. (x + y - 1)^3 = C(x - y + 3)$$

$$29. \ln(4x + 8y + 5) + 8y - 4x = C$$

$$30. (x - 2y - 1)^2 = C(x - 3y - 2)$$

$$31. 2x + 6y + C = -\ln(6x - 2y + 1)$$

## 4º TIPO: EQUAÇÕES EXATAS

**Forma :** A equação  $Mdx + Ndy = 0$  será uma equação diferencial exata, quando existir uma função  $f(x, y) = C$  tal que  $df = Mdx + Ndy = 0$  ou se a relação  $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$  for verdadeira.

**Resolução:** Dada a equação diferencial exata  $Mdx + Ndy = 0$  (1) e seja  $z = f(x, y) = C$  sua solução, cuja diferencial dada por  $dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$  (2). Então, comparando (1) e (2) teremos:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M(x, y) \text{ (3) e } \frac{\partial f}{\partial y} = N(x, y) \text{ (4).}$$

Para obtermos a sua solução  $z = f(x, y)$  deveremos integrar, por exemplo, a expressão (3), em relação à variável  $x$ , da qual teremos  $f(x, y) = \int M(x, y) dx + g(y)$  (5).

Derivando parcialmente (5) em relação à  $y$  teremos:  $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial \int M(x, y) dx}{\partial y} + g'(y)$  (6).

Igualando (6) e (4) resulta:  $\frac{\partial \int M(x, y)dx}{\partial y} + g'(y) = N(x, y)$ . Isolando  $g'(y)$  e integrando

em relação a  $y$  acharemos  $g(y) = \int \left( N(x, y) - \frac{\partial \int M(x, y)dx}{\partial y} \right) dy + C_1$  (7). Substituindo (7) em (5)

teremos a solução geral da equação exata, que é  $f(x, y) = \int M(x, y)dx + \int \left( N(x, y) - \frac{\partial \int M(x, y)dx}{\partial y} \right) dy = C$ .

**Exemplo:** Resolver a seguinte equação diferencial  $(3x^2 + 2y)dx + (2x - 4y + 5)dy = 0$ .

Inicialmente vamos verificar a que modelo esta equação pertence.

- i. Ela não é de variáveis separáveis porque temos soma das variáveis  $x$  e  $y$ ,
- ii. Ela não é homogênea porque os coeficientes das diferenciais não são funções homogêneas,
- iii. Para verificarmos se a equação é exata vamos utilizar a relação  $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ .

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial(3x^2 + 2y)}{\partial y} = 2$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial(2x - 4y + 5)}{\partial x} = 2$$

Como a condição  $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$  é verificada temos que a equação é exata.

A solução  $f(x, y) = C$  verifica  $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 0$ , assim comparando com a equação

dada teremos  $\frac{\partial f}{\partial x} = M(x, y)$  ou  $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2y$ , que integrado parcialmente em relação a  $x$  resulta

$$f = x^3 + 2yx + g(y).$$

Comparando  $\frac{\partial f}{\partial y} = N(x, y)$  teremos  $2x + g'(y) = 2x - 4y + 5$ . Logo  $g'(y) = -4y + 5$  que

integrado nos fornece  $g(y) = -2y^2 + 5y$ . Daí a solução  $f(x, y) = C$  fica:

$$x^3 + 2yx - 2y^2 + 5y = C$$

**Resolver as seguintes equações diferenciais:**

- 1)  $(x^2 - y^2)dx - 2xydy = 0$
- 2)  $(2x - y + 1)dx - (x + 3y - 2)dy = 0$
- 3)  $e^y dx + (xe^y - 2y)dy = 0$
- 4)  $(x^3 + y^2)dx + (2xy + \cos y)dy = 0$
- 5)  $[y \cos(xy) + \frac{y}{\sqrt{x}}]dx + [x \cos(xy) + 2\sqrt{x} + \frac{1}{y}]dy = 0$
- 6)  $(2x - 1)dx + (3y + 7)dy = 0$
- 7)  $(5x + 4y)dx + (4x - 8y^3)dy = 0$

- 8)  $(2y^2x - 3)dx + (2yx^2 + 4)dy = 0$   
 9)  $(3x^2y - 4 \ln x)dx + (x^3 - \ln y)dy = 0$   
 10)  $(y^3 - y^2 \operatorname{sen} x - x)dx + (3xy^2 + 2y \cos x)dy = 0$   
 11)  $\frac{dy}{dx} = \frac{2 + ye^{xy}}{2y - xe^{xy}}$   
 12)  $(4x^3y - 15x^2 - y)dx + (x^4 + 3y^2 - x)dy = 0$   
 13)  $(x + y)^2 dx + (2xy + x^2 - 1)dy = 0$  ,  $y(1) = 1$   
 14)  $(4y + 2x - 5)dx + (6y + 4x - 1)dy = 0$  ,  $y(-1) = 2$   
 15)  $\left(1 - \frac{3}{x} + y\right)dx + \left(1 - \frac{3}{y} + x\right)dy = 0$ .  
 16)  $\left(x^2y^3 - \frac{1}{1+9x^2}\right)\frac{dx}{dy} + x^3y^2 = 0$   
 17)  $(\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x \operatorname{sen} y)dx + \cos x \cos y dy = 0$   
 18)  $(1 - 2x^2 - 2y)\frac{dy}{dx} = 4x^3 + 4xy$   
 19)  $(y^2 \cos x - 3x^2y - 2x)dx + (2y \operatorname{sen} x - x^3 + \ln y)dy = 0$  ,  $y(0) = e$   
 20)  $x\frac{dy}{dx} = 2xe^x - y + 6x^2$

## 5º TIPO: EQUAÇÕES REDUTÍVEIS A EXATAS

Na equação  $Mdx + Ndy = 0$ , quando as derivadas parciais  $\frac{\partial M}{\partial y}$  e  $\frac{\partial N}{\partial x}$  diferirem, muitas vezes

pode-se determinar um fator integrante que irá transformar a equação dada numa equação exata.

Vejamos o exemplo:

Resolver a equação  $(y - x^2)dx + 2xdy = 0$ .

Primeiramente, é sempre importante verificar a que modelo esta equação pertence:

- i. Ela não é de variáveis separáveis porque temos soma das variáveis.
- ii. Ela não é homogênea porque os coeficientes das diferenciais são polinômios que não têm os mesmos graus.
- iii. Para verificarmos se a equação é exata vamos utilizar a relação  $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ .

Como  $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$ , pois  $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial(y - x^2)}{\partial y} = 1$  e  $\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial(2x)}{\partial x} = 2$  a equação também não é exata.

Agora vamos determinar um fator integrante, isto é, um fator que ao se multiplicar ambos os membros da equação a transforme em exata. Seja  $\lambda(x, y)$  este fator integrante.

Impondo que  $(y - x^2)\lambda(x, y)dx + 2x\lambda(x, y)dy = 0$  seja exata, teremos:

$$\frac{\partial[(y - x^2)\lambda(x, y)]}{\partial y} = \frac{\partial[2x\lambda(x, y)]}{\partial x}$$

$$1. \lambda(x, y) + (y - x^2) \frac{\partial \lambda(x, y)}{\partial y} = 2. \lambda(x, y) + 2x \frac{\partial \lambda(x, y)}{\partial x}$$

$$- \lambda(x, y) + (y - x^2) \frac{\partial \lambda(x, y)}{\partial y} = 2x \frac{\partial \lambda(x, y)}{\partial x}$$

A equação parcial acima admite infinitas soluções, dependendo da função  $\lambda$ . No entanto, necessitamos de somente um fator integrante e preferencialmente o mais simples. Assim, vamos impor a condição que o fator integrante seja uma função somente de  $x$ , isto é  $\frac{\partial \lambda}{\partial y} = 0$ , pois nos

interessa neste exemplo anular o termo que possui as duas variáveis  $x$  e  $y$ . Logo, teremos:

$$- \lambda = 2x \frac{d\lambda}{dx}$$

Separando as variáveis e integrando teremos um fator integrante:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Multiplicando ambos os membros da equação dada pelo fator integrante, resulta:

$$(y - x^2) \frac{1}{\sqrt{x}} dx + 2x \frac{1}{\sqrt{x}} dy = 0$$

$(y - x^2) \frac{1}{\sqrt{x}} dx + 2\sqrt{x} dy = 0$ , que é exata e terá solução geral igual a:

$$2y\sqrt{x} - \frac{2x^{5/2}}{5} = C$$

Através do processo anterior podemos determinar os seguintes fatores integrantes para a equação  $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$  (1):

- i. Se  $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = f(x)$  então  $e^{\int f(x)dx}$  é um fator integrante;
- ii. Se  $\frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} = f(y)$  então  $e^{\int f(y)dy}$  é um fator integrante;
- iii. Se  $Mx + Ny \neq 0$  e (1) é homogênea então  $\frac{1}{Mx + Ny}$  é um fator integrante.

**Resolva as seguintes equações diferenciais, mediante o uso de um fator integrante adequado:**

21)  $y^2 dx + (xy + 1)dy = 0$

26)  $(x + y)dx + x \ln x dy = 0$

22)  $(x^2 - y^2)dx + 2xydy = 0$

27)  $(2y - x^3)dx + xdy = 0$

23)  $xdy - ydx = x^2 e^x dx$

28)  $3x^2 y^2 dx + 4(x^3 y - 3)dy = 0$

24)  $y^2 dy + ydx - xdy = 0$

29)  $(x^2 + y^2 + x)dx + xydy = 0$

25)  $\frac{y}{x} dx + (y^3 + \ln x)dy = 0$

30)  $(x^4 + y^4)dx - xy^3 dy = 0$

**RESPOSTAS**

Equações exatas.

1.  $\frac{x^3}{3} - xy^2 = c$

2.  $2x^2 - 2xy + 2x + 4y - 3y^2 = c$

3.  $xe^y - y^2 = c$

4.  $\frac{x^4}{4} + xy^2 + \operatorname{sen}y = c$

5.  $\operatorname{sen}(xy) + 2y\sqrt{x} + \ln y = c$

6.  $x^2 - x + \frac{3y^2}{2} + 7y = c$

7.  $\frac{5x^2}{2} + 4xy - 2y^4 = c$

8.  $x^2y^2 - 3x + 4y = c$

9.  $x^3y - 4x \ln x - y \ln y + y + 4x = C$

10.  $xy^3 + y^2 \cos x - \frac{1}{2}x^2 = c$

11.  $2x + e^{xy} - y^2 = C$

12.  $x^4y - 5x^3 - xy + y^3 = c$

13.  $\frac{1}{3}x^3 + x^2y + xy^2 - y = 4/3$

14.  $4xy + x^2 - 5x + 3y^2 - y = 8$

15.  $x + y + xy - 3\ln xy = c$

16.  $x^3y^3 - \operatorname{tg}^{-1}3x = c$

17.  $-\ln|\cos x| + \cos x \operatorname{sen}y = c$

18.  $y - 2x^2y - y^2 - x^4 = c$

19.  $y^2 \operatorname{sen}x - x^3y - x^2 + y \ln y - y = 0$

20.  $xy - 2xe^x + 2e^x - 2x^3 = c$

21.  $xy + \ln y = c$

22.  $x + \frac{y^2}{x} = c$

23.  $y = Cx + xe^x$

24.  $y^2 + x = Cy$

25.  $4y \ln x + y^4 = C$

26.  $x + y \ln x + C = 0$

27.  $x^2y - \frac{x^5}{5} = C$

28.  $x^3y^4 - 4y^3 = C$

29.  $3x^4 + 4x^3 + 6x^2y^2 = C$

30.  $y^4 = 4x^4 \ln x + Cx^4$

**6º TIPO: EQUAÇÕES LINEARES DE 1ª ORDEM**

**Conceito:** As equações da forma  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$  (1), onde P e Q são funções de x ou constantes, são chamadas de equações lineares de 1ª ordem. Quando  $Q(x)=0$  a equação será chamada de linear homogênea, devido a analogia com os sistemas de equações algébricas lineares homogêneos, ou seja, aqueles que possuem termo independente igual a zero.

**Resolução:****1. Método de Lagrange ou da substituição.**

A equação linear será resolvida através da substituição  $y = z.t$  (2) que irá separar as variáveis, onde  $z=z(x)$  e  $t=t(x)$  são funções a determinar.

Derivando ambos os membros de (2) em relação à x e substituindo em (1), teremos

$$\frac{dz}{dx}t + \frac{dt}{dx}z + P(x)zt = Q(x) \quad (3).$$

Fatorando t no primeiro membro (3) vem:  $t\left(\frac{dz}{dx} + Pz\right) + \frac{dt}{dx}z = Q$  (4), e impondo que

$$\frac{dz}{dx} + Pz = 0, \text{ teremos: } z = e^{-\int P dx}, \text{ onde } P=P(x) \text{ e } Q=Q(x).$$

Voltando para (4) determinaremos  $t = \int e^{\int P dx} \cdot Q dx + C$ . Assim, resulta  $y = e^{-\int P dx} \left( \int e^{\int P dx} \cdot Q dx + C \right)$  que é a solução geral da equação linear.

## 2. Fator de integração

O fator  $\lambda = e^{\int P(x) dx}$  transformará a equação (1) numa equação diferencial exata, isto é:

Escrevendo (1) com diferenciais, vem  $dy + (Py - Q)dx = 0$ . Quando multiplicada pelo fator integrante  $\lambda$ , resultará na equação exata  $e^{\int P dx} dy + \left( P \cdot e^{\int P dx} y - Q \cdot e^{\int P dx} \right) dx = 0$ .

### Resolva as seguintes equações diferenciais:

1.  $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x - 2$
2.  $\frac{dy}{dx} - y \operatorname{tg} x = \operatorname{sen} x$
3.  $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} - \frac{\cot gx}{x} = 0$
4.  $(x + \operatorname{sen} y - 1)dy - \cos y dx = 0$
5.  $(1 + x^2) \frac{dy}{dx} + y = \operatorname{arctg} x$
6.  $\frac{dy}{dx} = 5y$
7.  $3 \frac{dy}{dx} + 12y = 4$
8.  $\frac{dy}{dx} + y = e^{3x}$
9.  $y' + 3x^2 y = x^2$
10.  $x^2 y' + xy = 1$
11.  $(x + 4y^2)dy + 2y dx = 0$
12.  $x dy = (x \operatorname{sen} x - y) dx$
13.  $(1 + e^x) \frac{dy}{dx} + e^x y = 0$
14.  $\cos x \frac{dy}{dx} + y \operatorname{sen} x = 1$
15.  $x \frac{dy}{dx} + 4y = x^3 - x$
16.  $x^2 \frac{dy}{dx} + x(x + 2)y = e^x$
17.  $\cos^2 x \operatorname{sen} x dy + (y \cos^3 x - 1) dx = 0$
18.  $y dx + (xy + 2x - ye^y) dy = 0$  (dica escreva dx/dy)
19.  $x \frac{dy}{dx} + (3x + 1)y = e^{-3x}$
20.  $y dx - 4(x + y^6) dy = 0$
21.  $\frac{dy}{dx} + y = \frac{1 - e^{-2x}}{e^x + e^{-x}}$
22.  $y dx + (x + 2xy^2 - 2y) dy = 0$
23.  $\frac{dr}{d\theta} + r \sec \theta = \cos \theta$
24.  $(x + 2)^2 \frac{dy}{dx} = 5 - 8y - 4xy$
25.  $\frac{dy}{dx} + 5y = 20$ , com  $y(0) = 2$
26.  $L \frac{di}{dt} + Ri = E$ , sendo L, R e E constantes, com  $i(0) = i_0$
27.  $y' + (\operatorname{tg} x)y = \cos^2 x$ , com  $y(0) = -1$
28.  $\frac{dT}{dt} = k(T - 50)$ , com  $T(0) = 200$
29.  $(x + 1) \frac{dy}{dx} + y = \ln x$ , sendo  $y(1) = 10$
30.  $x(x - 2) \frac{dy}{dx} + 2y = 0$ , com  $y(3) = 6$
31.  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{y - x}$ , sendo  $y(5) = 2$
32. Encontre uma solução contínua satisfazendo  $\frac{dy}{dx} + y = f(x)$ , em que  $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{se } x > 1 \end{cases}$  e a condição  $y(0) = 0$

## RESPOSTAS

1)  $y = x(x - 2 \ln x + C)$

2)  $y = \sec x \left( \frac{\sin^2 x}{2} + C \right)$

3)  $y = \frac{\ln(\sin x) + C}{x}$

4)  $x = (\operatorname{tg} y + \sec y)(2 \sec y - 2 \operatorname{tg} y + y + C)$

5)  $y = \operatorname{arctg} x - 1 + C e^{-\operatorname{arctg} x}$

6)  $y = c e^{5x}$

7)  $y = \frac{1}{3} + c e^{-4x}$

8)  $y = \frac{1}{4} e^{3x} + c e^{-x}$

9)  $y = \frac{1}{3} + c e^{-x^3}$

10)  $y = x^{-1} \ln x + c x^{-1}$

11)  $x = -\frac{4}{5} y^2 + c y^{-1/2}$

12)  $y = -\cos x + \frac{\sin x}{x} + \frac{c}{x}$

13)  $y = \frac{c}{e^x + 1}$

14)  $y = \sin x + c \cos x$

15)  $y = \frac{1}{7} x^3 - \frac{1}{5} x + c x^{-4}$

16)  $y = \frac{1}{2x^2} e^x + \frac{c}{x^2} e^{-x}$

17)  $y = \sec x + c \operatorname{cosec} x$

18)  $x = \frac{1}{2} e^y - \frac{1}{2y} e^y + \frac{1}{4y^2} e^y + \frac{c}{y^2} e^{-y}$

19)  $y = e^{-3x} + \frac{c}{x} e^{-3x}$

20)  $x = 2y^6 + cy^4$

21)  $y = e^{-x} \ln(e^x + e^{-x}) + c e^{-x}$

22)  $x = \frac{1}{y} + \frac{c}{y} e^{-y^2}$

23)  $(\sec \theta + \operatorname{tg} \theta)r = \theta - \cos \theta + c$

24)  $y = \frac{5}{3x+6} + \frac{c}{(x+2)^4}$

25)  $y = 4 - 2e^{-5x}$

26)  $i(t) = E/R + (i_0 - E/R)e^{-Rt/L}$

27)  $y = \sin x \cos x - \cos x$

28)  $T(t) = 50 + 150e^{kt}$

29)  $(x+1)y = x \ln x - x + 21$

30)  $y = \frac{2x}{x-2}$

31)  $x = \frac{1}{2} y + \frac{8}{y}$

32)  $y = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ (e-1)e^{-x}, & \text{se } x > 1 \end{cases}$

## 7º TIPO: EQUAÇÕES DE BERNOULLI

### Conceito:

As equações da forma  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$  (1) com  $n \neq 1$ , onde P e Q são funções de x ou constantes, são chamadas de equações de Bernoulli.

### Resolução:

Para resolvermos a equação de Bernoulli iremos transformá-la numa equação linear multiplicando ambos os membros de (1) por  $y^{-n}$ , o que implicará em  $y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x)$

(2).

Em (2), chamando  $y^{1-n} = t$ , obteremos  $\frac{1}{1-n} \cdot \frac{dt}{dx} + P(x)t = Q(x)$  que escrita como

$\frac{dt}{dx} + (1-n)P(x)t = (1-n)Q(x)$  representa uma equação linear.

Como exemplo da equação de Bernoulli, podemos citar um modelo empírico usado para a determinação do peso de peixes, que é a equação de Von Bertalanffy,

$$\frac{dp}{dt} + \beta p = \alpha p^{2/3},$$

onde  $p$  é peso de cada peixe em função do tempo  $t$ ,  $\alpha$  é a constante de anabolismo, isto é, a taxa de síntese de massa por unidade de superfície do peixe e  $\beta$  é a constante de catabolismo, representando a taxa de diminuição da massa por unidade de massa.

### Resolva as seguintes equações de Bernoulli:

1.  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x} = 3xy^2$

2.  $\frac{dy}{dx} - 2xy = xy^3$

3.  $\frac{dy}{dx} + xy = x^3y^3$

4.  $x \frac{dy}{dx} + y = \frac{1}{y^2}$

5.  $\frac{dy}{dx} = y(xy^3 - 1)$

6.  $x^2 \frac{dy}{dx} + y^2 = xy$

7.  $x^2 \frac{dy}{dx} - 2xy = 3y^4$ , com  $y(1) = 1/2$

8.  $x \frac{dy}{dx} + y = x^3y^3$

9.  $\frac{dy}{dx} = \frac{4}{x}y + x\sqrt{y}$

10.  $2xy \frac{dy}{dx} - y^2 + x = 0$

11.  $\frac{dy}{dx} + \frac{2y}{x} = 2y^2$

12.  $xdy = y(y^2 + 1)dx$

13.  $(1-x^2) \frac{dy}{dx} = xy + xy^2$

### Respostas:

1.  $y = \frac{-4x^2}{3x^4 + C}$

2.  $y^2 = \frac{-2e^{2x^2}}{e^{2x^2} + C}$

3.  $y = (x^2 + 1 + Ce^{x^2})^{-1/2}$

4.  $x^3y^3 - x^3 = C$

5.  $-x - \frac{1}{3} + \frac{1}{y^3} = Ce^{3x}$

6.  $\frac{x}{y} - \ln x = C$

7.  $y^{-3} = -\frac{9}{5x} + \frac{49}{5x^6}$

8.  $-2x^3y^2 + Cx^2y^2 = 1$

9.  $y = x^4 \left( \frac{1}{2} \ln x + C \right)^2$

10.  $\frac{y^2}{x} + \ln x = C$

11.  $Cx^2y + 2xy = 1$

12.  $\frac{x^2}{y^2} + x^2 = C$

13.  $y = \frac{-1}{1 + C\sqrt{1-x^2}}$

## 8º TIPO: EQUAÇÕES DE RICCATI

### Conceito:

As equações da forma  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^2 + R(x)$  (1), onde P, Q e R são funções de x ou constantes, são chamadas de equações de Riccati.

### Resolução:

Para sua resolução algébrica deveremos conhecer uma solução particular  $y = y_0$  qualquer de (1), na qual a mudança de variáveis  $y = z + y_0$  irá eliminar o termo independente R(x) transformando a equação de Riccati numa equação de Bernoulli.

**Resolva as seguintes equações de Riccati, onde  $y_1$  é uma solução conhecida para a equação:**

1.  $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^2} = 3$ , com  $y_1 = x$

2.  $(1+x^3)\frac{dy}{dx} + 2xy^2 + x^2y + 1 = 0$ , com  $y_1 = -x$

3.  $\frac{dy}{dx} + (2x-1)y - xy^2 = x-1$ , com  $y_1 = 1$

4.  $\frac{dy}{dx} = -2 - y + y^2$ , com  $y_1 = 2$

5.  $\frac{dy}{dx} = -\frac{4}{x^2} - \frac{1}{x}y + y^2$ , com  $y_1 = \frac{2}{x}$

6.  $\frac{dy}{dx} = e^{2x} + (1+2e^x)y + y^2$ , com  $y_1 = -e^x$

7.  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}y^2 - 2\left(1 - \frac{1}{x}\right)y + x - 1$ , com  $y_1 = x$

8.  $\frac{dy}{dx} + y^2 + 3y + 2 = 0$ , sendo  $y_1 = -1$

### Respostas:

1.  $\frac{x^4(y-x)}{y+3x} = C$

2.  $\frac{1+x^3}{x+y} - x^2 = C$

3.  $\frac{1}{y-1} + x - 1 = Ce^{-x}$

4.  $\frac{y-2}{y+1} = Ce^{3x}$

5.  $\frac{x^4}{xy-2} + \frac{x^4}{4} = C$

7.  $\frac{x^2}{y-x} + \frac{x^2}{2} = C$

6.  $\frac{1}{y+e^x} + 1 = Ce^{-x}$

8.  $\frac{1}{y+1} + 1 = Ce^x$

## 9º TIPO: SUBSTITUIÇÕES DIVERSAS

Tais equações não se enquadram diretamente em nenhum dos modelos anteriores, mas após a aplicação de uma determinada mudança de variáveis elas se transformarão numa equação diferencial conhecida.

Resolva as seguintes equações diferenciais, por uma substituição apropriada:

1)  $y(1+2xy)dx + x(1-2xy)dy = 0$

2)  $2xy \frac{dy}{dx} + 2y^2 = 3x - 6$

3)  $x \frac{dy}{dx} - y = \frac{x^3}{y} e^{\frac{y}{x}}$

4)  $xe^{2y} \frac{dy}{dx} + e^{2y} = \frac{\ln x}{x}$

5)  $ydx + (1+ye^x)dy = 0$

6)  $\frac{dy}{dx} - \frac{4}{x}y = 2x^5 e^{\frac{y}{x^4}}$

7)  $2yy' + x^2 + y^2 + x = 0$

8)  $2x \operatorname{cosec} 2y \frac{dy}{dx} = 2x - \ln(\operatorname{tgy})$

9)  $x^4 y^2 \frac{dy}{dx} + x^3 y^3 = 2x^3 - 3$

10)  $\frac{dy}{dx} + 1 = e^{-(x+y)} \operatorname{sen} x$

11)  $\operatorname{sen} y \frac{dy}{dx} = \cos x (2 \cos y - \operatorname{sen}^2 x)$

12)  $x \cdot \operatorname{sen} y dy + (x^3 - 2x^2 \cos y + \cos y) dx = 0$

13)  $(2x^2 + 3y^2 - 7)dx - (3x^2 + 2y^2 - 8)dy = 0$

14)  $x^2(xdx + ydy) + y(xdy - ydx) = 0$

15)  $(x - 2\operatorname{sen} y + 3)dx + (2x - 4\operatorname{sen} y - 3) \cos y dy = 0$

### Respostas:

1.  $x = Cye^{\frac{1}{2xy}}$

2.  $x^2 y^2 = x^3 - 3x^2 + C$

3.  $x + y = x(C - x)e^{\frac{y}{x}}$

4.  $x^2 e^{2y} = 2x \ln x - 2x + C$

5.  $e^{-x} = y \ln y + Cy$

6.  $-e^{-\frac{y}{x^4}} = x^2 + C$

7.  $x^2 + y^2 = x - 1 + Ce^{-x}$

8.  $\ln(\operatorname{tgy}) = x + \frac{C}{x}$

9.  $x^3 y^3 = 2x^3 - 9 \ln x + C$

10.  $e^y = -e^{-x} \cos x - Ce^{-x}$

11.  $\cos y = \frac{\operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen} x}{2} + \frac{1}{4} + Ce^{-\operatorname{sen} x}$

12.  $2 \cos y = x + Cxe^{-x^2}$

13.  $(x^2 - y^2 - 1)^5 = C(x^2 + y^2 - 3)$

14.  $(x^2 + y^2)(x+1)^2 = Cx^2$

15.  $8\operatorname{sen} y + 4x + 9 \ln(4x - 8\operatorname{sen} y + 3) = C$

## APLICAÇÕES DAS EQUAÇÕES DE 1ª ORDEM E 1º GRAU

- Determine a equação das curvas que possuem a subnormal constante.
- Determine a equação das curvas que possuem a subtangente constante.
- Nos problemas a seguir determine as trajetórias ortogonais de cada família de curvas dadas:

a.  $y = cx$

e.  $y^2 = cx^3$

h.  $r = 2c \cos \theta$

b.  $y = cx^2$

f.  $y = \frac{x}{1+cx}$

i.  $r^2 = c \sin 2\theta$

c.  $cx^2 + y^2 = 1$


g.  $2x^2 + y^2 = 4cx$

d.  $y = ce^{-x}$

- Encontre as curvas das trajetórias ortogonais de  $x + y = ce^y$ , que passam por  $P(0,5)$ .
- Um investidor aplica determinada quantia que triplica em 30 meses. Em quanto tempo essa quantia estará quadruplicada, supondo que o aumento é proporcional ao capital existente a cada instante?
- Sabe-se que a população de uma certa comunidade cresce a uma taxa proporcional ao número de pessoas presentes em qualquer instante. Se a população duplicou em 5 anos, quando ela triplicará?
- Suponha que a população da comunidade do problema 6 anterior seja 10.000 após 3 anos. Qual era a população inicial? Qual será a população em 10 anos?
- A população de bactérias em uma cultura cresce a uma taxa proporcional ao número de bactérias presentes em qualquer tempo. Após 3 horas, observa-se que há 400 bactérias presentes. Após 10 horas existem 2000. Qual era o número inicial de bactérias?
- O isótopo radioativo de chumbo, Pb-209, decresce a uma taxa proporcional à quantidade presente em qualquer tempo. Sua meia-vida é 3,3 horas. Se 1 grama de chumbo está presente inicialmente, quanto tempo levará para 90% de chumbo desaparecer?
- Quando um raio de luz vertical passa através de uma substância transparente, a taxa na qual sua intensidade  $I$  decresce é proporcional a  $I(t)$ , em que  $t$  representa a espessura do meio (em metros). No mar a intensidade a 3 m abaixo da superfície é de 25% da intensidade inicial  $I_0$  do raio incidente. Qual é a intensidade do raio a 15m abaixo da superfície?
- Segundo a Lei de Newton, a velocidade de resfriamento de um corpo no ar é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do ar. Se a temperatura do ar é  $20^\circ\text{C}$  e o corpo se resfria em 20 minutos de  $100^\circ\text{C}$  para  $60^\circ\text{C}$ , dentro de quanto tempo sua temperatura descenderá para  $30^\circ\text{C}$ ?
- Um termômetro é retirado de uma sala, em que a temperatura é  $70^\circ\text{F}$ , e colocado no lado fora onde a temperatura é  $10^\circ\text{F}$ . Após 0,5 minuto o termômetro marcava  $50^\circ\text{F}$ . Qual será a temperatura marcada pelo termômetro no instante  $t=1$  minuto? Quanto levará para marcar  $15^\circ\text{F}$ ?
- Um indivíduo é encontrado morto em seu escritório pela secretária que liga imediatamente para a polícia. Quando a polícia chega, 2 horas depois da chamada, examina o cadáver e o ambiente tirando os seguintes dados. A temperatura do escritório era de  $20^\circ\text{C}$ , o cadáver inicialmente tinha uma temperatura de  $35^\circ\text{C}$ . Uma hora depois medindo novamente a temperatura do corpo obteve  $34,2^\circ\text{C}$ . O investigador, supondo que a temperatura de uma pessoa

- viva é de  $36.5^{\circ}\text{C}$ , prende a secretária. Por que?. No dia seguinte o advogado da secretária a liberta, alegando o que?
14. Em um depósito há 100l de uma solução aquosa que contém 10kg de sal. Jogase água neste depósito com uma velocidade de  $3\text{l}/\text{min}$  ao mesmo tempo em que, através de um orifício desse tanque, a mistura escoo com uma velocidade de  $2\text{l}/\text{min}$ . A mistura se mantém homogênea por agitação. Que quantidade de sal haverá no tanque 1h depois de iniciada a operação
  15. Inicialmente, 50 gramas de sal são dissolvidos em um tanque contendo 300 litros de água. Uma solução salina é bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 3 litros por minuto e a solução bem misturada é então drenada na mesma taxa. Se a concentração da solução que entra é 2 gramas por litro, determine a quantidade de sal no tanque em qualquer instante. Quantas gramas de sal estão presentes após 50 minutos? E após um longo tempo?
  16. Um tanque contém 500 litros de água pura. Uma solução salina contendo 2g de sal por litro é bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 5 litros por minuto. A mistura é drenada à mesma taxa. Encontre a quantidade de gramas de sal no tanque em qualquer instante.
  17. Suponha que um estudante infectado com um vírus da gripe retorne a uma faculdade isolada no campus onde se encontra 1000 estudantes. Presumindo que a taxa na qual o vírus se espalha é proporcional não somente à quantidade de alunos infectados, mas também à quantidade de alunos não infectados, determine o número de alunos infectados após 6 dias se ainda é observado que depois de 4 dias  $x(4) = 50$ .
  18. Uma lancha se desloca numa lagoa com uma velocidade de 10m/s. Em dado instante seu motor é desligado, com isso a lancha sofre uma redução de velocidade proporcional à velocidade instantânea. Sabendo que ao final de 5 segundos sua velocidade é de 8m/s, qual será o tempo necessário para que a lancha adquira velocidade de 1m/s?
  19. Um bote está sendo rebocado a uma velocidade de  $12\text{nós}(6,17\text{m/s})$ . No instante em que o cabo do reboque é largado, um homem no bote começa a remar, no sentido do movimento com uma força de 10N. Sabendo que o peso do homem e do bote é 200N e que a resistência ao deslocamento, em N, é de  $2.6v$ , sendo  $v$  a velocidade em  $\text{m/s}$ , achar a velocidade do bote no fim de 30 segundos.
  20. Uma bateria de 12 volts é conectada a um circuito em série no qual a indutância é de 0.5 Henry e a resistência 10 ohms. Determine a corrente  $i$  se a corrente inicial é zero.
  21. Achar a equação da curva que passa pelo ponto  $P(5,6)$ , conhecendo-se a declividade de sua tangente num ponto qualquer  $\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{3y}$ .
  22. Achar a equação da curva cuja subtangente seja o dobro da abscissa do ponto de contato.
  23. Achar a equação da curva cuja subtangente num ponto  $P(x,y)$  seja igual à ordenada de  $P$ .
  24. Uma curva dada passa pelos pontos  $(0,0)$  e  $(3,9)$ . Achar a sua equação sabendo que a mesma tem a propriedade de dividir o retângulo formado pelos eixos coordenados e pelas retas paralelas a estes, tomadas por um ponto  $P(x,y)$ , em duas partes, sendo a área de uma delas o triplo da outra.
  25. Achar a equação da família de curvas em que a subnormal, num ponto  $P(x,y)$  seja igual à abscissa desse ponto.

26. Um marca passo, como indicado na figura abaixo, consiste em uma bateria, um capacitor e o coração como resistor. Quando a chave S está em P, o capacitor C é carregado; quando S está em Q, o capacitor R descarregado, enviando um impulso elétrico ao coração. Durante esse tempo, a voltagem E aplicada ao coração é dada por  $\frac{dE}{dt} = -\frac{1}{RC}E$ ,  $t_1 < t < t_2$ , onde R e C são constantes. Determine E(t) se  $E(t_1) = E_0$ . (É claro que a chave é aberta e fechada periodicamente para simular o batimento cardíaco natural.)



27. Em março de 1987 a população mundial atingiu cinco bilhões, e estava crescendo à taxa de 380 mil pessoas por dia. Assumindo-se taxas de natalidade e mortalidade constantes, para quando se deve esperar uma população mundial de 10 bilhões de pessoas.
28. É um fato da física que os elementos radioativos se desintegram espontaneamente em um processo chamado decaimento radioativo. Os experimentos têm mostrado que a taxa de desintegração é proporcional à quantidade de elemento presente. Sabe-se que a meia-vida específica do carbono-14 radioativo está em torno de 5730 anos. Em 1988, o Vaticano autorizou o Museu Britânico a datar a relíquia de pano conhecida como o Sudário de Turim, possivelmente o sudário de Jesus de Nazaré. Este pano, que apareceu em 1356, contém o negativo da imagem de um corpo humano que se acreditava no mundo inteiro ser o de Jesus. O relatório do Museu mostrou que as fibras no pano continham entre 92 e 93% do carbono-14 original. Use esta informação para estimar a idade do sudário.
29. Ache uma curva do plano xy que passa pelo ponto P(0,3) e cuja reta tangente em um ponto qualquer tem inclinação  $2x/y^2$ .
30. Uma bala de massa  $m = 3.56 \times 10^{-3} \text{ kg}$  é disparada para cima com uma velocidade inicial  $v_0 = 988 \text{ m/s}$ , e torna-se mais lenta pela força da gravidade e uma força de resistência do ar de  $kV^2$ , sendo  $k = 7.3 \times 10^{-6} \text{ kg/m}$ . Determine a altura máxima atingida pela bala. (Considere  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ )

31. Considere um compartimento que contém 3 litros de água salgada. Suponha que água, contendo 25 gramas de sal por litro, esteja sendo bombeada no compartimento a uma taxa de 2 litros por hora, e a mistura, que é homogeneizada continuamente é bombeada para fora do compartimento com a mesma taxa. Encontre a concentração de sal na mistura após 3 horas.
32. Em uma certa floresta tropical, “restos vegetais” (principalmente devido à vegetação morta) se acumulam no solo a uma taxa de  $10 \text{ g/cm}^2/\text{ano}$ . Ao mesmo tempo, entretanto, estes restos vegetais se decompõem a uma taxa de 80% ao ano. Determine a quantidade de restos vegetais, em  $\text{g/cm}^2$ , após 5 anos, sabendo-se que inicialmente esta quantidade era de  $300 \text{ g/cm}^2$ .
33. Um assado pesando 5 libras, inicialmente a  $50^\circ\text{F}$ , é posto num forno a  $375^\circ\text{F}$  às 5 horas da tarde. Depois de 75 minutos a temperatura do assado é de  $125^\circ\text{F}$ . Quando será a temperatura do assado de  $150^\circ\text{F}$  (meio mal passado).
34. Uma pedra é solta a partir do repouso de uma altura  $h$  acima da superfície da Terra. Desprezando a resistência do ar, qual a velocidade com que atinge o solo?
35. Um tanque hemisférico tem raio do topo de  $121.92 \text{ cm}$  e no instante  $t=0$ s está cheio de água. Neste momento um buraco circular com diâmetro de  $2.54 \text{ cm}$  é aberto no fundo do tanque. Quanto demorará para que toda a água do tanque tenha escoado? (Dica: Use a equação de Torricelli  $A(y) \frac{dy}{dt} = -a\sqrt{2gy}$  e  $g=9,8 \text{ m/s}^2$  para

$$\text{chegar a } \pi(8y - y^2) \frac{dy}{dt} = -\pi \left( \frac{1}{24} \right)^2 \sqrt{64y}$$

36. Um aterrissador lunar está em queda livre em direção à superfície da lua a uma velocidade de  $1000 \text{ mi/h}$ . Seus foguetes retro propulsores, quando disparados no espaço livre, produzem uma desaceleração de  $33000 \text{ mi/h}^2$ . A que altura da superfície lunar devem os foguetes retro propulsores ser ativados para assegurar um pouso suave ( $v=0$ ) no impacto? (Considere  $g_{\text{Lua}}=13 \text{ km/h}^2$  e  $r_{\text{Lua}}=1,08 \text{ km}$ )
37. Suponha que uma corda flexível de 4 pés de extensão começa com 3 pés de seu comprimento arrumados num monte bem junto à borda de uma mesa horizontal, com o resto pendurado (em repouso) para fora da mesa. No instante  $t=0$  o monte começa a desenrolar e a corda começa gradualmente a cair para fora da mesa, sob a força da gravidade puxando a parte pendurada. Assumindo que as forças de atrito de quaisquer tipo sejam negligenciáveis, quanto tempo levará para toda a corda cair para fora da mesa? (Dica:  $\omega g x = \frac{d(\omega x v)}{dt} = \omega \left( x \frac{dv}{dt} + v \frac{dx}{dt} \right)$ . Você

$$\text{chegará na integral imprópria } T = \left( \frac{2}{3g} \right)^{1/2} \int_0^{\arccos 1/8} (\sec u)^{4/3} du, \text{ onde } \sec^2 u = x^3 \text{ que}$$

deverá ser resolvida pela Regra de Simpson com 100 subintervalos ou por integração numérica.)

## RESPOSTAS

1)  $y^2 = 2Kx + C$

2)  $y = e^{\frac{x}{K} + C}$

3)

a)  $x^2 + y^2 = C^2$

f)  $x^3 + y^3 = C$

b)  $2y^2 + x^2 = C$

g)  $y^2 \ln y + x^2 = Cy^2$

c)  $2 \ln y = x + y^2 + C$

d)  $y^2 = 2x + C$

e)  $2x^2 + 3y^2 = C$

4)  $y = 2 - x + 3e^{-x}$

5) 37.8 meses

6) 7.9 anos

7). 6598; 26392

8). 200

9) 11 horas

10)  $I(15)=0.00098I_0$

11)  $t = 60$  minutos

12)  $T(1)=36.67^\circ\text{F}$  em 3.06 minutos

13)

14) 3.91 kg de sal

15)  $A(50)=266.41$  gramas

$A(\infty) = 600$  gramas

16)  $A(t) = 1000 - 1000e^{-t/100}$

17) 276 estuantes

18) 51,6 segundos

19) 3,9 m/s

20)  $i(t) = 1.2 - 1.2e^{-20t}$

34)  $v = \sqrt{2gh}$

35)  $t=2150$ s

36) 25 milhas

37)  $t=0,541$ s

h)  $r = C \operatorname{sen} \theta$

i)  $r^2 = C \cos 2\theta$

21)  $3y^2 - 2x^2 = 58$

22)  $y^2 = xC^2$

23)  $y = x + C$

24)  $y = \frac{x^3}{3}$  ou  $y^3 = 243x$

25)  $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$

26)  $E(t) = E_0 e^{(-t+t_1)/RC}$

27)  $t = \frac{\ln 2}{0,0278} \approx 25$  anos  $\rightarrow 2012$

28) De 600 a 689 anos

29)  $y = (3x^2 + 27)^{1/3}$

30) 1298,23m

31)  $75 + (y_0 - 75) \cdot e^{-2}$

32) 17,76g/cm<sup>2</sup>

33)  $t=105$  minutos  $\rightarrow 6$ h45min

## ENVOLTÓRIAS E SOLUÇÕES SINGULARES DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

### Curvas integrais:

Família de curvas que representa a solução geral de uma equação diferencial.

### Envolvida:

É cada uma das curvas integrais. Representa geometricamente uma solução particular da equação.

### Envoltória:

É a curva tangente, em cada um dos seus pontos, a uma curva da família de curvas integrais. (Cf. PISKOUNOV N. *Cálculo diferencial e integral*. V II, Porto: Lopes da Silva, 1984, p. 43).

### Equação da envoltória:


Seja a família de envolvidas cuja equação é dada por  $y = f(x, C) \Leftrightarrow F(x, y, C) = 0$ , onde  $C$  é um parâmetro com as seguintes características:

Nas envolvidas,  $C$  é uma constante;

Na envoltória  $y = g(x)$ ,  $C$  é uma função de  $x$  e  $y$ , ou seja,  $C = C(x,y) \neq \text{constante}$ .

Um ponto  $P(x,y)$  pertencente à envoltória também satisfaz a equação  $F(x, y, C(x,y))=0$ , pois pertence a certa curva da família.

Neste ponto  $P(x,y)$ ,  $\left(\frac{dy}{dx}\right)_e = \left(\frac{dy}{dx}\right)_E$ , onde :



$\left(\frac{dy}{dx}\right)_e$  é a declividade da reta tangente à envolvida  $e$ ;

$\left(\frac{dy}{dx}\right)_E$  é a declividade da reta tangente à envoltória  $E$

Derivando  $F(x, y, C(x,y))=0$  em relação a  $x$ , vem:  $\frac{\partial F}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial C} \cdot \frac{\partial C}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial C} \cdot \frac{\partial C}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x} = 0$  (1)

Nas envolvidas, como  $C = \text{constante}$ , vem de (1):  $\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$ ,  $\frac{\partial F}{\partial y} \neq 0$ .

Na envoltória, como em qualquer ponto  $P(x,y)$   $\left(\frac{dy}{dx}\right)_e = \left(\frac{dy}{dx}\right)_E$ , vem de (1) que:

$$\frac{\partial F}{\partial C} \cdot \frac{\partial C}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial C} \cdot \frac{\partial C}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial C} \left( \frac{\partial C}{\partial x} + \frac{\partial C}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x} \right) = 0.$$

Como  $C = C(x,y) \neq \text{constante}$ , vem que  $\frac{\partial F}{\partial C} = 0$ .

Daí, a equação da envoltória é dada resolvendo-se o seguinte sistema: 
$$\begin{cases} F(x, y, C(x,y)) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial C} = 0 \end{cases}.$$

### EXERCÍCIOS:

1) Dar a envoltória das seguintes famílias de curvas, onde  $\alpha$  é o parâmetro. Represente num mesmo sistema cartesiano as curvas integrais e sua envoltória:

a)  $y = 4\alpha^2 \cdot x + \frac{1}{\alpha}$

b)  $x^2 + y^2 + 2 \cdot (\alpha + 2) \cdot y + \alpha^2 = 0$

02) Determinar a envoltória da família de retas que forma com os semi-eixos positivos um triângulo de área constante igual a 20.

**Resposta:**

1) a)  $y^3 = 27x$

b)  $x^2 + 4y = 0$

2)  $x \cdot y = 10$

**Solução singular de uma equação diferencial:**

**Conceito:** A solução singular de uma equação diferencial é uma solução que satisfaz a equação, mas não é uma de suas soluções particulares.

Geometricamente, a solução singular é representada pela envoltória das curvas integrais, quando esta envoltória existe. Isto decorre do fato de que em cada ponto  $(x_0, y_0)$  da envoltória, o coeficiente angular da reta tangente à envoltória e à curva integral corresponde a  $\frac{dy_0}{dx}$ . Assim, os

elementos  $x_0, y_0$  e  $\frac{dy_0}{dx}$  em cada ponto da envoltória satisfazem a equação diferencial  $F(x, y, \frac{dy}{dx})=0$ , uma vez que são sempre elementos de uma linha integral.

**EXERCÍCIOS:**

01) Encontre a solução singular da equação  $x\sqrt{1-y^2} dx = dy$ . Represente geometricamente a solução geral e a singular num mesmo sistema cartesiano.

02) Obter a solução geral e singular das seguintes equações:

a)  $y^2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y^2 = 1$

b)  $y - x \cdot \frac{dy}{dx} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$

c)  $y = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - x \cdot \frac{dy}{dx} + \frac{x^2}{2}$

d)  $y = x \cdot \frac{dy}{dx} - \ln \frac{dy}{dx}$

e)  $y = y \cdot (y')^2 + 2xy'$

**Resposta:**

01)  $y = \sin\left(\frac{x^2}{2} + C\right)$  e  $y = \pm 1$

02) a)  $(x-C)^2 + y^2 = 1$  e  $y = \pm 1$       b)  $y = Cx + C^2$  e  $y = -\frac{x^2}{4}$

c)  $y = \frac{x^2}{2} + Cx + C^2$  e  $y = \frac{x^2}{4}$       d)  $y = Cx - \ln C$  e  $y = 1 + \ln x$

e)  $y^2 = 4C^2 - 4Cx$  e como solução singular o ponto  $P(0,0)$ .

## EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE 1ª ORDEM E GRAU DIFERENTE DE 1:

### EQUAÇÕES DE CLAIRAUT

**Conceito:** São as equações da forma  $y = x \frac{dy}{dx} + f\left(\frac{dy}{dx}\right)$ .

**Resolução:** Chamando  $\frac{dy}{dx} = p$  a equação de Clairaut fica  $y = xp + f(p)$ .

Derivando a equação anterior em relação a  $x$ , teremos:

$$\frac{dy}{dx} = x \frac{dp}{dx} + p \cdot 1 + f'(p) \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dp}{dx}(x + f'(p)) = 0$$

Logo  $p=C$  e a solução geral será:

$$y = Cx + f(C)$$

Derivando a solução geral parcialmente em relação ao parâmetro  $C$ , teremos  $x + f'(C) = 0$ , que é a condição para obtermos a solução singular.

**Resolva as seguintes equações e obtenha uma solução singular:**

1.  $y = xy' + 1 - \ln y'$

2.  $y = x \frac{dy}{dx} - \left(\frac{dy}{dx}\right)^3$

3.  $xy' - y = e^{y'}$

4.  $y = xy' + \frac{1}{2}(y')^2$

5.  $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - x \frac{dy}{dx} + y = 0$

6.  $y - xy' = 3(y')^2$

7.  $x \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 - y \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 1 = 0$

8.  $\frac{dy}{dx} \left( x \frac{dy}{dx} - y + 5 \right) + 4 = 0$

9.  $y = xy' - (y')^{-2}$

10.  $y = x \frac{dy}{dx} + \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$

**Aplicações:**

11. Achar a curva, em que a soma dos segmentos determinados sobre os eixos cartesianos pela reta tangente seja igual a  $k$ .

12. Achar a curva, em que o produto dos segmentos determinados sobre os eixos cartesianos pela reta tangente seja igual a  $k$ .

**Respostas:**

1.  $y = cx + 1 - \ln c$  ,  $y = 2 + \ln x$
2.  $y = cx - c^3$  ,  $27y^2 = 4x^3$
3.  $y = cx - e^c$  ,  $y = x \ln x - x$
4.  $y = cx + \frac{c^2}{2}$  ,  $y = -\frac{x^2}{2}$
5.  $y = cx - c^2$  ,  $x^2 = 4y$
6.  $y = cx + 3c^2$  ,  $x^2 = -12y$
7.  $y = cx + \frac{1}{c^2}$  ,  $4y^3 = 27x^2$
8.  $c(5 - y + cx) + 4 = 0$  ,  $(y - 5)^2 = 16x$
9.  $y = cx - 1/c^2$  ,  $y^3 = -27x^2 / 4$
10.  $y = cx + \sqrt{1 + c^2}$  ,  $y = \sqrt{1 - x^2}$
11.  $(x + y - k)^2 = 4xy$
12.  $4xy = k$

**EQUAÇÕES DE LAGRANGE**

**Conceito:** São as equações da forma  $y = xf\left(\frac{dy}{dx}\right) + g\left(\frac{dy}{dx}\right)$ .

**Resolução:** Chamando  $\frac{dy}{dx} = p$  a equação de Lagrange fica  $y = xf(p) + g(p)$ .

Derivando a equação anterior em relação a x, teremos:

$$\frac{dy}{dx} = xf'(p)\frac{dp}{dx} + f(p).1 + g'(p)\frac{dp}{dx}$$

$$p - f(p) = \frac{dp}{dx}(xf'(p) + g'(p))$$

$$(p - f(p))\frac{dx}{dp} = xf'(p) + g'(p)$$

$$\frac{dx}{dp} - \frac{f'(p)}{p - f(p)}x = \frac{g'(p)}{p - f(p)} \quad (\text{que é uma equação linear}).$$

Como em geral não será possível isolar p na solução da equação linear anterior, a solução geral da equação de Lagrange será dada na forma paramétrica:

$$\begin{cases} x = x(p) \\ y = y(p) \end{cases}$$

**Resolva as seguintes equações:**

$$1. y = x \frac{dx}{dy} - \frac{dy}{dx}$$

$$2. y = 2x \frac{dy}{dx} - x \left( \frac{dy}{dx} \right)^2$$

$$3. y = \left(1 + \frac{dy}{dx}\right)x + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$$

$$4. y = -\frac{1}{2} \frac{dy}{dx} \left(2x + \frac{dy}{dx}\right)$$

$$5. y = 2x \frac{dy}{dx} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$$

$$6. y = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 \cdot e^{dy/dx}$$

$$7. y = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 2 \ln \frac{dy}{dx}$$

$$8. y = 2x \frac{dy}{dx} + \frac{dx}{dy}$$

$$9. y = \frac{dy}{dx} + \sqrt{1 - \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

$$10. 4y = x^2 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$$

### Aplicação:

11. Achar a curva em que a reta tangente em qualquer ponto P, da curva, seja bissetriz do ângulo formado pela reta vertical que passa por P e pela reta que une P à origem.

### Respostas:

$$1. \begin{cases} x = -\frac{p}{\sqrt{p^2-1}} \left[ \ln(p + \sqrt{p^2-1}) - C \right] \\ y = -\frac{1}{\sqrt{p^2-1}} \left[ \ln(p + \sqrt{p^2-1}) - C \right] - p \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x = \frac{C}{p^2} \\ y = \frac{2C}{p} - C \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x = ce^{-p} - 2p + 2 \\ y = c(1+p)e^{-p} - p^2 + 2 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x = \frac{1}{3}(cp^{-1/2} - p) \\ y = \frac{1}{6}(2cp^{1/2} - p^2) \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} x = c/3p^2 - 2p/3 \\ y = (2c - p^3)/3p \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} x = e^p + pe^p + c \\ y = p^2 \cdot e^p \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} x = 2p - 2c/p \\ y = p^2 + 2 \ln p \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} x = \frac{\ln p + C}{p^2} \\ y = \frac{2 \ln p + 2C + 1}{p} \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} x = \ln p - \operatorname{arcsen} p + C \\ y = p + \sqrt{1-p^2} \end{cases}$$

$$10. 4y = x^2 + p^2$$

$$11. C^2 x^2 - 2Cy - 1 = 0$$

## EQUAÇÕES LINEARES DE ORDEM SUPERIOR

### Tipos especiais de equações de 2ª ordem:

**1º) Equação do tipo:**  $\frac{d^2y}{dx^2} = f(x)$

*Solução:*

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x) \Rightarrow \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = f(x) \Rightarrow d \left( \frac{dy}{dx} \right) = f(x) dx. \text{ Integrando ambos os membros,}$$

vem:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \int f(x) dx + C_1 \\ dy &= \left[ \int f(x) dx + C_1 \right] dx \\ y &= \int \left[ \int f(x) dx + C_1 \right] dx + C_2 \end{aligned}$$

Ex: Resolva a equação  $\frac{d^2y}{dx^2} - 6x + 7 = 0$

**2º) Equação do tipo**  $\frac{d^2y}{dx^2} = f(x, \frac{dy}{dx})$ :

Faz-se  $\frac{dy}{dx} = p$ ,  $p = p(x)$ , vem:  $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dp}{dx}$ .

Assim, tem-se  $\frac{dp}{dx} = f(x, p)$ , que é uma equação de primeira ordem em relação a  $p$ , cuja solução geral desta equação é  $p = F(x, C_1)$ .

Como  $p = \frac{dy}{dx}$ , vem:

$$\frac{dy}{dx} = F(x, C_1) \Rightarrow dy = F(x, C_1) dx \Rightarrow y = \int F(x, C_1) dx + C_2$$

Ex.: Resolva as equações:

a)  $(1+x) \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = 0$

b)  $y'' - y' = 6e^x$

**3º) Equação do tipo**  $\frac{d^2y}{dx^2} = f(y)$ :

Faz-se  $\frac{dy}{dx} = p$ ,  $p = p(y)$ , donde vem:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}.$$

Como  $p \frac{dp}{dy} = f(y) \Rightarrow p dp = f(y) dy \Rightarrow \int p dp = \int f(y) dy \Rightarrow p^2 = 2 \left[ \int f(y) dy \right] + C_1.$

Daí vem:

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 2\left[\int f(y)dy\right] + C_1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \pm\sqrt{2\left[\int f(y)dy\right] + C_1} \Rightarrow dx = \frac{dy}{\pm\sqrt{2\left[\int f(y)dy\right] + C_1}}$$

que é uma equação de variáveis separadas em  $x$  e  $y$ .

Ex.: Resolva a equação  $y'' + 9y = 0$

Ex: Uma partícula de massa  $m$  se desloca ao longo do eixo dos  $x$  atraída por outra, situada na origem, com a força  $F = -4mx^{-3}$ , sendo  $x > 0$ . Determinar a equação do movimento, sabendo-se que para  $t=0$  se tem  $x = 2$  e a velocidade  $v = -\sqrt{3}$ .

**4º) Equação do tipo**  $\frac{d^2y}{dx^2} = f\left(y, \frac{dy}{dx}\right)$ :

Procedendo de modo análogo ao anterior, a equação se reduz a  $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$ .

Resolvendo-a em relação a  $p$  e substituindo pelo seu valor  $\frac{dy}{dx}$ , obtém-se uma equação de variáveis separadas.

Ex.: Resolver a equação  $y \cdot y'' - y^2 \cdot y' = (y')^2$

## Equações lineares de ordem superior

**Forma:** Equações diferenciais lineares de ordem superior são as equações da forma

$$A_n \frac{d^n y}{dx^n} + A_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + A_2 \frac{d^2 y}{dx^2} + A_1 \frac{dy}{dx} + A_0 y = B \quad (1), \text{ onde } A_i \text{ e } B \text{ são constantes ou}$$

funções de  $x$ , com  $i = 0 \dots n$ . Quando  $B=0$  diremos que a equação é linear homogênea.

**Resolução:** Iremos inicialmente resolver as equações lineares homogêneas de coeficientes constantes.

Observe que se fizermos  $A_n = \dots = A_2 = 0$  teremos uma equação linear de primeira ordem cuja solução particular pode ser da forma  $y = e^{rx}$ . Impondo que tal solução seja também uma solução particular da equação linear homogênea de coeficientes constantes, teremos a equação polinomial  $A_n r^n + A_{n-1} r^{n-1} + \dots + A_2 r^2 + A_1 r + A_0 = 0$ , chamada de equação característica.

Em relação à equação característica podemos ter três casos a considerar:

**i. Todas as raízes da equação característica são reais e distintas**

Sejam  $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$  as raízes reais e distintas da equação característica, então a solução geral será dada por:

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} + C_3 e^{r_3 x} + \dots + C_n e^{r_n x}$$

**ii. A equação característica tem raízes complexas**

Sejam  $r_1 = a + bj$  e  $r_2 = a - bj$  as raízes complexas da equação característica  $A_2 r^2 + A_1 r + A_0 = 0$ , proveniente da equação linear de segunda ordem

$A_2 \frac{d^2 y}{dx^2} + A_1 \frac{dy}{dx} + A_0 y = 0$ , então a solução geral será dada por:

$$y = e^{ax}(C_1 \cos bx + C_2 \operatorname{sen} bx)$$

iii. *A equação característica tem raízes múltiplas*

Sejam  $r_1 = r_2$  raízes múltiplas da equação característica  $A_2 r^2 + A_1 r + A_0 = 0$ , proveniente da equação linear de segunda ordem  $A_2 \frac{d^2 y}{dx^2} + A_1 \frac{dy}{dx} + A_0 y = B$ , então a solução geral será dada por:

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 x e^{r_1 x}$$

**EXERCÍCIOS:**

Encontre a solução geral para cada equação dada:

1.  $4y'' + y' = 0$

2.  $y'' - 36y = 0$

3.  $y'' + 9y = 0$

4.  $y'' - y' - 6y = 0$

5.  $y'' + 8y' + 16y = 0$

6.  $y'' + 3y' - 5y = 0$

7.  $12y'' - 5y' - 2y = 0$

8.  $y'' - 4y' + 5y = 0$

9.  $3y'' + 2y' + y = 0$

10.  $y''' - 4y'' - 5y' = 0$

11.  $y''' - y = 0$

12.  $y''' - 5y'' + 3y' + 9y = 0$

13.  $y''' + y'' - 2y = 0$

14.  $y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$

15.  $\frac{d^4 y}{dx^4} + \frac{d^3 y}{dx^3} + \frac{d^2 y}{dx^2} = 0$

16.  $16 \frac{d^4 y}{dx^4} + 24 \frac{d^2 y}{dx^2} + 9y = 0$

Resolva as seguintes equações sujeita às condições indicadas:

17.  $y'' + 16y = 0$ ,  $y(0) = 2$  e  $y'(0) = -2$

18.  $y'' + 6y' + 5y = 0$ ,  $y(0) = 0$  e  $y'(0) = 3$

19.  $2y'' - 2y' + 5y = 0$ ,  $y(0) = -1$  e  $y'(0) = 0$

20.  $y'' + y' + 2y = 0$ ,  $y(0) = y'(0) = 0$

21.  $y'' - 3y' + 2y = 0$ ,  $y(1) = 0$  e  $y'(1) = 1$

22.  $y''' + 12y'' + 36y' = 0$ ,  $y(0) = 0$  e  $y'(0) = 1$  e  $y''(0) = -7$

**Respostas:**

1.  $y = c_1 + c_2 e^{-x/4}$

2.  $y = c_1 e^{-6x} + c_2 e^{6x}$

3.  $y = c_1 \cos 3x + c_2 \operatorname{sen} 3x$

4.  $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-2x}$

5.  $y = c_1 e^{-4x} + c_2 x e^{-4x}$

6.  $y = c_1 e^{(-3+\sqrt{29})x/2} + c_2 e^{(-3-\sqrt{29})x/2}$
7.  $y = c_1 e^{2x/3} + c_2 e^{-x/4}$
8.  $y = e^{2x} (c_1 \cos x + c_2 \sin x)$
9.  $y = e^{-x/3} (c_1 \cos \frac{\sqrt{2}}{3} x + c_2 \sin \frac{\sqrt{2}}{3} x)$
10.  $y = c_1 + c_2 e^{-x} + c_3 e^{5x}$
11.  $y = c_1 e^x + e^{-x/2} (c_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + c_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x)$
12.  $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x} + c_3 x e^{3x}$
13.  $y = c_1 e^x + e^{-x} (c_2 \cos x + c_3 \sin x)$
14.  $y = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x} + c_3 x^2 e^{-x}$
15.  $y = c_1 + c_2 x + e^{-x/2} \left( c_3 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + c_4 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right)$
16.  $y = c_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + c_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x + x \left( c_3 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + c_4 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right)$
17.  $y = 2 \cos 4x - \frac{\sin 4x}{2}$
18.  $y = -\frac{3e^{-5x}}{4} + \frac{3e^{-x}}{4}$
19.  $y = -e^{x/2} \cos(3x/2) + \frac{e^{x/2} \sin(3x/2)}{3}$
20.  $y = 0$
21.  $y = e^{2x-2} - e^{x-1}$
22.  $y = \frac{5}{36} - \frac{5e^{-6x}}{36} + \frac{x e^{-6x}}{6}$

## EQUAÇÕES LINEARES NÃO HOMOGÊNEAS

A solução geral de uma equação linear não homogênea tem a forma:

$$y = y_c + y_p, \text{ onde:}$$

$y_c$  é chamada solução característica ou complementar e é determinada resolvendo a equação linear como se fosse homogênea; já para determinarmos  $y_p$ , denominada solução particular, dispomos dos seguintes métodos:

- i. Método dos coeficientes a determinar ou método de Descartes
- ii. Método da variação de parâmetros ou método de Lagrange
- iii. Método do operador derivada D.

## MÉTODO DOS COEFICIENTES A DETERMINAR

Neste método impõem-se uma solução particular, de acordo com a forma do termo independente da equação linear. Podemos dividir este método nos seguintes casos particulares:

1º caso: O termo independente B é uma exponencial da forma  $B = e^{ax}$ . A solução particular terá a forma:

$$y_p = Ax^h e^{ax}, \quad \text{onde}$$

h é a multiplicidade da raiz  $r=a$  na equação característica e A é um coeficiente a determinar.

2º caso: O termo independente B é da forma  $B = \text{sen} ax$  ou  $B = \cos ax$ . A solução particular terá a forma:

$$y_p = x^h (A \text{sen} ax + B \cos ax), \quad \text{onde}$$

h é a multiplicidade da raiz  $r=aj$  na equação característica e A e B são coeficientes a determinar.

3º caso: O termo independente B é um polinômio de grau m. A solução particular será um polinômio de grau  $m+r$ , onde r é a ordem da derivada de menor ordem da equação linear.

4º caso: O termo independente B é uma soma, subtração ou multiplicação de exponenciais, polinômios, senos ou cossenos. A solução particular será uma soma, subtração ou multiplicação dos termos do termo independente.

### EXERCÍCIOS:

Resolva as seguintes equações diferenciais, pelo método dos coeficientes a determinar:

1.  $y''+3y'+2y = 6$

12.  $y''-y' = -3$

2.  $y''-10y'+25y = 30x + 3$

13.  $y''-y'+\frac{y}{4} = 3 + e^{x/2}$

3.  $\frac{1}{4}y''+y'+y = x^2 - 2x$

14.  $y''+4y = 3 \text{sen} 2x$

4.  $y''+4y'-2y = 2x^2 - 3x + 6$

15.  $y''+y = 2x \text{sen} x$

5.  $y''-9y = 54$

16.  $y''-2y'+5y = e^x \cos 2x$

6.  $y''-y'+y = 2 \text{sen} 3x$

17.  $y''+2y'+y = \text{sen} x + 3 \cos 2x$

7.  $y''+25y = 6 \text{sen} x$

18.  $y'''-6y'' = 3 - \cos x$

8.  $16y^{(4)} - y = e^{x/2}$

19.  $y'''-3y''+3y'-y = x - 4e^x$

9.  $y''-5y'+4y = 8e^x$

20.  $\frac{d^4 y}{dx^4} + 2\frac{d^2 y}{dx^2} + y = (x-1)^2$

10.  $\frac{d^4 y}{dx^4} - 2\frac{d^3 y}{dx^3} + \frac{d^2 y}{dx^2} = e^x + 1$

21.  $y''+y = 8 \text{sen}^2 x$

11.  $y''+3y = -48x^2 e^{3x}$

Resolva as seguintes equações diferenciais, sujeita às condições iniciais dadas:

22.  $y''+4y = -2, \quad y\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{2} \text{ e } y'\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2$

23.  $5y''+y' = -6x, \quad y(0) = 0 \text{ e } y'(0) = -10$

24.  $y''+y'+5y = 35e^{-4x}, \quad y(0) = -3 \text{ e } y'(0) = 1$

$$25. \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = F_0 \operatorname{sen} \omega t, \quad x(0) = 0 \text{ e } x'(0) = 0$$

$$26. y'' + y = \cos x - \operatorname{sen} 2x, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \text{ e } y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$27. y''' - 2y'' + y' = 2 - 24e^x + 40e^{5x}, \quad y(0) = \frac{1}{2}, \quad y'(0) = \frac{5}{2} \text{ e } y''(0) = -\frac{9}{2}$$

### Respostas

$$1. y = Ae^{-x} + Be^{-2x} + 3$$

$$2. y = Ae^{5x} + Bxe^{5x} + \frac{6x}{5} + \frac{3}{5}$$

$$3. y = Ae^{-2x} + Bx^{-2x} + x^2 - 4x + 7/2$$

$$4. y = Ae^{-(2+\sqrt{6})x} + Be^{(-2+\sqrt{6})x} - x^2 - \frac{5x}{2} - 9$$

$$5. y = Ae^{-3x} + Be^{3x} - 6$$

$$6. y = e^{1/2} \left( A \cos \frac{\sqrt{3}x}{2} + B \operatorname{sen} \frac{\sqrt{3}x}{2} \right) + \frac{6 \cos 3x}{73} + \frac{-16 \operatorname{sen} 3x}{73}$$

$$7. y = A \cos 5x + B \operatorname{sen} 5x + \frac{\operatorname{sen} x}{4}$$

$$8. y = Ae^{x/2} + Be^{-x/2} + C \cos x / 2 + D \operatorname{sen} x / 2 + xe^{x/2} / 8$$

$$9. y = Ae^x + Be^{4x} - \frac{8xe^x}{3}$$

$$10. y = A + Bx + Ce^x + Dxe^x + \frac{x^2}{2}(e^x + 1)$$

$$11. y = A \cos \sqrt{3}x + B \operatorname{sen} \sqrt{3}x + (-4x^2 + 4x - 4/3)e^{3x}$$

$$12. y = A + Be^x + 3x$$

$$13. y = Ae^{x/2} + Bxe^{x/2} + 12 + \frac{1}{2}x^2e^{x/2}$$

$$14. y = A \cos 2x + B \operatorname{sen} 2x - \frac{3}{4}x \cos 2x$$

$$15. y = A \operatorname{sen} x + B \cos x - \frac{x^2}{2} \cos x + \frac{1}{2}x \operatorname{sen} x$$

$$16. y = e^x (A \cos 2x + B \operatorname{sen} 2x) + \frac{xe^x \operatorname{sen} 2x}{4}$$

$$17. y = Ae^{-x} + Bxe^{-x} - \frac{\cos x}{2} + \frac{12 \operatorname{sen} 2x}{25} - \frac{9 \cos 2x}{25}$$

$$18. y = A + Bx + Ce^{6x} - \frac{x^2}{4} - \frac{6 \cos x}{37} + \frac{\operatorname{sen} x}{37}$$

$$19. y = Ae^x + Bxe^x + Cx^2e^x - x - 3 - \frac{2x^3e^x}{3}$$

$$20. y = A \cos x + B \operatorname{sen} x + Cx \cos x + Dx \operatorname{sen} x + x^2 - 2x - 3$$

$$21. y = A \operatorname{sen} x + B \cos x + 4 + \frac{4 \cos 2x}{3}$$

$$22. y = \sqrt{2} \operatorname{sen} 2x - 1/2$$

$$23. y = -200 + 200e^{-x/5} - 3x^2 + 30x$$

$$24. y = -10e^{-2x} \cos x + 9e^{-2x} \operatorname{sen} x + 7e^{-4x}$$

$$25. x = \frac{F_o}{2\omega^2} \operatorname{sen} \omega t - \frac{F_o}{2\omega} t \cos \omega t$$

$$26. y = \frac{-\cos x}{6} - \frac{\pi \operatorname{sen} x}{4} + \frac{x \operatorname{sen} x}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{3}$$

$$27. y = 11 - 11e^x + 9xe^x + 2x - 12x^2e^x + e^{5x}/2$$

## MÉTODO DA VARIAÇÃO DE PARÂMETROS (LAGRANGE)

Vamos desenvolver o método inicialmente para uma equação linear de segunda ordem  $\frac{d^2 y}{dx^2} + A_1 \frac{dy}{dx} + A_0 y = B$  (1). A solução característica de (1) é dada por  $y_c = C_1 y_1 + C_2 y_2$  e a solução particular será dada por  $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$ , onde  $u_1$  e  $u_2$  são funções que serão determinadas pela resolução do sistema:

$$\begin{cases} u'_1 y_1 + u'_2 y_2 = 0 \\ u'_1 y'_1 + u'_2 y'_2 = B \end{cases}$$

### EXERCÍCIOS:

Resolva as seguintes equações diferenciais pelo método da variação de parâmetros:

$$1. y'' + y = \sec x$$

$$8. y'' - y = \cosh x$$

$$2. y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$$

$$9. y'' - 4y = e^x \cos x$$

$$3. y'' + y = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$$

$$10. y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{1 + e^x}$$

$$4. y'' + 9y = \cot g 3x$$

$$11. y'' + 3y' + 2y = \operatorname{sen} e^x$$

$$5. y'' - 2y = 4x^2 e^{x^2}$$

$$12. y'' + 9y = 2 \sec 3x$$

$$6. y'' + y = \operatorname{sen} x$$

$$13. y'' - 2y' + y = x^{-2} e^x$$

$$7. y'' + y = \cos^2 x$$

$$14. y'' + 4y = \operatorname{sen}^2 x$$

### Respostas:

$$1. y = A \cos x + B \operatorname{sen} x + x \operatorname{sen} x + \cos x \cdot \ln(\cos x)$$

$$2. y = (A + Bx)e^x + xe^x \ln x$$

$$3. y = A \cos x + B \operatorname{sen} x - x \cdot \cos x + \operatorname{sen} x \cdot \ln(\operatorname{sen} x)$$

4.  $y = A \cos 3x + B \operatorname{sen} 3x + \frac{\operatorname{sen} 3x}{9} \cdot \ln \operatorname{tg} \left( \frac{3x}{2} \right)$
5.  $y = A e^{x\sqrt{2}} + B e^{-x\sqrt{2}} + e^{x^2}$
6.  $y = A \cos x + B \operatorname{sen} x - \frac{x \cos x}{2}$
7.  $y = A \cos x + B \operatorname{sen} x + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} \cos 2x$
8.  $y = A e^x + B e^{-x} + \frac{x e^x}{4} - \frac{x e^{-x}}{4} = A e^x + B e^{-x} + \frac{x \operatorname{sen} h x}{2}$
9.  $y = A e^{2x} + B e^{-2x} + \frac{e^x}{10} (\operatorname{sen} x - 2 \cos x)$
10.  $y = A e^{-x} + B e^{-2x} + (e^{-x} + e^{-2x}) \ln(1 + e^x)$
11.  $y = A e^{-x} + B e^{-2x} - e^{-2x} \operatorname{sen} e^x$
12.  $y = A \operatorname{sen} 3x + B \cos 3x + \frac{2}{3} \operatorname{sen} 3x + \frac{2}{9} (\cos 3x) \ln(\cos 3x)$
13.  $y = A e^x + B x e^x - e^x (1 + \ln x)$
14.  $y = A \operatorname{sen} 2x + B \cos 2x + \frac{1}{8} (1 - x \operatorname{sen} 2x)$

## MÉTODO DO OPERADOR DERIVADA

**Conceito:** Dada uma função definida por  $y=f(x)$ , chama-se operador derivada, denotado por  $D$ , a

$$D = \frac{d}{dx}, D^2 = \frac{d^2}{dx^2}, D^3 = \frac{d^3}{dx^3}, \dots$$

### Propriedades:

Sejam  $u=u(x)$  e  $v=v(x)$ :

P1.  $D(u+v)=Du+Dv$

P2.  $D(a.u)=a.Du$ ,  $a \in \mathfrak{R}$

P3.  $D^m(D^n u)=D^{m+n}u$ , com  $m \in \mathfrak{R}$  e  $n \in \mathfrak{R}$ .

P4. O operador direto  $(D-a)u = Du - a.u$ ,  $a \in \mathfrak{R}$ .

P5. O operador inverso  $\frac{1}{D-a}u = e^{ax} \int e^{-ax} .u .dx$ ,  $a \in \mathfrak{R}$ .

Exemplo: Resolver a equação  $(D^2 - 5D + 6)y = e^{3x}$ , utilizando o operador inverso.

$$(D^2 - 5D + 6)y = e^{3x}$$

$$(D-2)(D-3)y = e^{3x}$$

$$(D-3)y = \frac{1}{D-2} e^{3x}$$

$$(D-3)y = e^{2x} \int e^{-2x} .e^{3x} dx$$

$$(D-3)y = e^{2x} (e^x + C)$$

$$(D-3)y = e^{3x} + C e^{2x}$$

$$y = \frac{1}{D-3}(e^{3x} + Ce^{2x})$$

$$y = e^{3x} \int e^{-3x}(e^{3x} + Ce^{2x})dx$$

$$y = e^{3x}(x - Ce^{-x} + C_1)$$

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{2x} + x e^{3x}$$

## SIMPLIFICAÇÃO DO MÉTODO DO OPERADOR DERIVADA

### Casos particulares

1°. Na equação diferencial  $P(D)y = e^{ax}$  a solução particular será dada por  $y_p = \frac{1}{P(a)}e^{ax}$ , se

$P(a) \neq 0$

2°. Na equação diferencial  $P(D^2)y = \text{sen}(ax)$  a solução particular será dada por

$$y_p = \frac{1}{P(-a^2)} \text{sen}(ax).$$

3°. Na equação diferencial  $P(D^2)y = \text{cos}(ax)$  a solução particular será dada por

$$y_p = \frac{1}{P(-a^2)} \text{cos}(ax).$$

4°. Na equação diferencial  $P(D)y = x^m$  a solução particular será dada por  $y_p = \frac{1}{P(D)}x^m$ , onde

$\frac{1}{P(D)}$  deverá ser desenvolvido em série de potências crescentes em D.

5°. Na equação diferencial  $P(D)y = e^{ax} \cdot f(x)$  a solução particular será dada por

$$y_p = e^{ax} \frac{1}{P(D+a)} f(x).$$

### EXERCÍCIOS:

**Resolver as seguintes equações diferenciais empregando o operador inverso:**

1.  $(D^2 - 3D + 2)y = e^{-x} \text{sen } x$
2.  $(D^3 - 16D)y = e^{4x} + 1$
3.  $(D^2 - 7D + 12)y = 5e^{3x}$
4.  $(D^3 - 3D + 2)y = x e^{-2x}$

**Resolver as seguintes equações diferenciais empregando o método dos operadores:**

- |  |   |
|--|---|
| 5. $(D^2 - 3D + 2)y = 5e^{3x}$           | 11. $(D^2 + 25)y = 20 \text{sen } 5x$   |
| 6. $(D^2 - 3D + 2)y = 3e^{2x}$           | 12. $(D^2 - 4)y = x - 1$                |
| 7. $(D-1)^2(D-2)y = 3e^x + 2e^{-x}$      | 13. $(D^2 - 3D + 2)y = x^2 - 3$         |
| 8. $(D^2 - D - 12)y = e^{4x}$            | 14. $(D^3 - 4D^2 + 4D)y = x^2 + 2x - 1$ |
| 9. $(D^2 + 4)y = 3 \text{cos } x$        | 15. $(D^2 - 2D - 3)y = 4e^x - 9$        |
| 10. $(D^2 - 3D + 2)y = 2 \text{sen } 2x$ | 16. $(D^2 - 4)y = x^2 e^x$              |

17.  $(D^2 - 3D + 2)y = e^x \text{sen} 2x$

18.  $(D^2 - 2D + 5)y = e^x \text{sen } x$

19.  $(D^4 + 2D^3 - 3D^2)y = x^2 + 3e^{2x} + 4 \text{sen } x$

20.  $(D^2 - 4D + 3)y = 2xe^{3x} + 3e^x \cos 2x$

**Respostas**

1.  $y = Ae^x + Be^{2x} + \frac{e^x}{2}(\cos x - \text{sen} x)$

2.  $y = A + Be^{-4x} + Ce^{4x} + \frac{xe^{4x}}{32} - \frac{x}{16}$

3.  $y = Ae^{3x} + Be^{4x} - 5xe^{3x}$

4.  $y = Ae^x + Bxe^x + Ce^{-2x} + \frac{2xe^{-2x}}{27} + \frac{x^2 e^{-2x}}{18}$

5.  $y = Ae^x + Be^{2x} + \frac{5}{2}e^{3x}$

6.  $y = Ae^x + Be^{2x} + 3xe^{2x}$

7.  $y = Ae^x + Bxe^x + Ce^{2x} - \frac{3}{2}x^2 e^x - \frac{1}{6}e^{-x}$

8.  $y = Ae^{-3x} + Be^{4x} + \frac{xe^{4x}}{7}$

9.  $y = A \cos 2x + B \text{sen} 2x + \cos x$

10.  $y = Ae^x + Be^{2x} + \frac{1}{10}(3 \cos 2x - \text{sen} 2x)$

11.  $y = A \cos 5x + B \text{sen} 5x - 2x \cos 5x$

12.  $y = Ae^{-2x} + Be^{2x} - \frac{x}{4} + \frac{1}{4}$

13.  $y = Ae^x + Be^{2x} + \frac{x^2}{2} + \frac{3x}{2} + \frac{1}{4}$

14.  $y = A + Be^{2x} + Cxe^{2x} + \frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{2} + \frac{5x}{8}$

15.  $y = Ae^{-x} + Be^{3x} - e^x + 3$

16.  $y = Ae^{2x} + Be^{-2x} - e^x \left( \frac{x^2}{3} + \frac{4x}{9} + \frac{14}{27} \right)$

17.  $y = Ae^x + Be^{2x} + \frac{e^x}{10}(\cos 2x - 2 \text{sen} 2x)$

18.  $y = e^x(A \cos 2x + B \text{sen} 2x) + \frac{e^x \text{sen} x}{3}$

19.  $y = A + Bx + Ce^x + De^{-3x} - \frac{x^4}{36} - \frac{2x^3}{27} - \frac{7x^2}{27} + \frac{3e^{2x}}{20} + \frac{2}{5}(\cos x + 2 \text{sen} x)$

20.  $y = Ae^x + Be^{3x} + \frac{xe^{3x}}{2}(x-1) - \frac{3e^x}{8}(\text{sen} 2x + \cos 2x)$

## EQUAÇÃO DE EULER-CAUCHY

A equação de Euler-Cauchy tem a seguinte forma:

$$A_n(ax+b)^n \frac{d^n y}{dx^n} + \dots + A_2(ax+b)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + A_1(ax+b) \frac{dy}{dx} + A_0 y = B, \text{ onde } A_0, A_1, \dots, A_n, a \text{ e } b$$

são constantes. Para resolver tal equação faremos  $ax+b = a.e^t$ , que irá eliminar os coeficientes variáveis.

### EXERCÍCIOS:

**Resolver as seguintes equações diferenciais:**

1.  $(2x+1)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 2(2x+1) \frac{dy}{dx} - 12y = 6x$

2.  $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} - 12y = 0$

3.  $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = \ln x$

4.  $x^2 y'' - 3xy' + 3y = 2x^4 e^{-x}$

5.  $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + 2y = 3x$

6.  $x^3 y'''' + 3x^2 y''' - 2xy'' + 2y = 0$

7.  $x^3 y'''' + 2xy''' - 2y = x^2 \ln x + 3x$

8.  $(1+x)^3 y'''' + 9(1+x)^2 y''' + 18(1+x)y'' + 6y = \ln(1+x)$

9.  $x^2 y'' + 3xy' = 0$ , com  $y(1) = 0$  e  $y'(1) = 4$

10.  $x^2 y'' + xy' + y = 0$ , com  $y(1) = 1$  e  $y'(1) = 2$

**Resolva as seguintes equações diferenciais por desenvolvimento em série:**

11.  $x \frac{dy}{dx} - y - x^2 = 0$

12.  $xy' - y - x^2 e^x = 0$

13.  $(1+x^2)y'' + xy' - y = 0$

### Respostas

1.  $y = A \frac{2}{2x+1} + B \left( \frac{2x+1}{2} \right)^3 - \frac{6x+3}{16} + \frac{1}{4}$

2.  $y = Ax^3 + Bx^{-4}$

3.  $y = Ax + Bx \ln x + 2 + \ln x$

4.  $y = Ax + Bx^3 + 2x^2 e^x - 2x e^x$

5.  $y = Ax + Bx^2 - 3x \ln x$


6.  $y = Ax + Bx \ln x + Cx^{-2}$

7.  $y = Ax + x[B \cos(\ln x) + C \operatorname{sen}(\ln x)] + \frac{x^2 \ln x}{2} - x^2 + 3x \ln x$
8.  $y = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3} + \frac{\ln(x+1)}{6} - \frac{11}{36}$
9.  $y = 2 - \frac{2}{x^2}$
10.  $y = \cos(\ln x) + 2 \operatorname{sen}(\ln x)$
11.  $y = Ax + x^2$
12.  $y = Ax + xe^x$
13.  $y = A_0 + A_1 x + \frac{A_2}{2} x^2 - \frac{A_3}{8} x^4 + \dots$

## APLICAÇÕES

### 1. Molas

Um corpo de massa  $m$  é conectado a uma mola de comprimento  $l$  e constante elástica  $k$ , provocando um deslocamento  $s$  na mola, atingindo o equilíbrio. Após o equilíbrio, se a massa for deslocada de uma distância  $x$  e solta, teremos um movimento harmônico simples.



Pela 2ª lei de Newton  $F = ma$ . Como  $a = \frac{d^2 x}{dt^2}$  teremos:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -ks - kx + mg$$

Mas como na posição de equilíbrio  $mg = ks$ , vem:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx, \quad (1)$$


sujeito às condições iniciais  $x(0) = x_0$  e  $x'(0) = x_1$ . Resolvendo, teremos a equação do movimento.

Obs.: Quando tivermos uma força de resistência ao movimento, devida ao meio ambiente, por exemplo, vamos supor que esta força seja proporcional à velocidade. Assim a equação (1) acima ficará:


$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx - \alpha \frac{dx}{dt}$ , onde  $\alpha$  é uma constante de proporcionalidade.

## 2. Deformação em vigas horizontais

Dada uma viga simplesmente apoiada de comprimento (vão)  $2l$ , sujeita a uma carga uniformemente distribuída  $q$ .




Para determinar as reações de apoio, poderemos associar a carga uniformemente distribuída a uma carga concentrada equivalente, aplicada no centro de gravidade da carga uniforme.



Aplicando as equações de equilíbrio da Estática ( $\sum H = 0$ ,  $\sum V = 0$  e  $\sum M = 0$ ) chegaremos a  $R_A = R_B = ql$ , onde  $H$ ,  $V$  e  $M$  são as componentes horizontais, verticais e momentos estáticos, respectivamente.

Para a determinação da equação dos momentos, tomaremos uma seção  $S$ , qualquer, na estrutura.




Chegando a:  $M_S = R_A \cdot x - qx \cdot \frac{x}{2} = \frac{qlx}{2} - \frac{qx^2}{2}$ .

Sabemos da Mecânica que  $\frac{EI}{R} = M$ , onde  $E$  é o módulo de elasticidade,  $I$  é o momento de inércia da seção transversal,  $R$  é o raio de curvatura da linha elástica. Do Cálculo Diferencial,

sabemos que  $R = \frac{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2}}{\frac{d^2y}{dx^2}}$ . Como a inclinação da linha elástica é muito pequena, podemos

impor que  $\frac{dy}{dx} = 0$ , chegando a  $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI}$ , que sujeita as condições de contorno  $y(0)=0$  e  $y'(l)=0$ , nos dará a equação da linha elástica.

### 3. Circuitos elétricos RLC em série



Aplicando a segunda Lei de Kirchoff, chegamos a:

$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E(t)$ , que sujeito às condições iniciais  $i(0)=i_0$  e  $q(0)=q_0$ , nos dará a equação da carga  $q=q(t)$  num circuito RLC, em série.

Exercícios:

1. Uma certa mola, cuja constante é  $k=48\text{lb/ft}$ , é mantida na vertical, estando sua extremidade superior presa a um suporte. Um corpo pesando  $16\text{lb}$  é amarrado à extremidade inferior da mola. Depois do sistema em repouso, o corpo é puxado  $2$  polegadas para baixo e em seguida solto. Desprezando a resistência do ar, discutir o movimento.
2. Uma viga horizontal simplesmente apoiada, de comprimento  $2l$  está sujeita a uma carga uniformemente distribuída  $q$ . Determinar a equação da linha elástica e a deformação máxima (flecha).
3. Determinar a equação da corrente ( $i$ ) e a equação da carga ( $q$ ) em um circuito com uma indutância de  $0,5$  henry, uma resistência de  $20$  ohms, uma capacitância de  $100$  microfarads e uma força eletromotriz dada por  $E(t) = 100 \cos 200t$ , sujeito às condições iniciais  $i=0$  e  $q=0$  quando  $t=0$ .
4. Um peso de  $0,5\text{kg}$  é atado a uma mola de  $1,5\text{m}$  de comprimento. Na posição de equilíbrio, o comprimento da mola é de  $2,48\text{m}$ . Se o peso for suspenso e solto a partir do repouso de um ponto  $2\text{m}$  acima da posição de equilíbrio, encontre o deslocamento  $x(t)$  se é sabido ainda que o meio ambiente oferece uma resistência numericamente igual à velocidade instantânea.

Respostas:

1.  $x = \frac{\cos \sqrt{96}t}{6}$
2.  $EIy = \frac{qlx^3}{6} - \frac{qx^4}{24} - \frac{ql^3x}{3}$ ,  $y_{\max} = \frac{5ql^4}{24EI}$
3.  $q = e^{-200t} (-0,01 \cos 400t - 0,0075 \text{sen} 400t) + 0,01 \cos 200t + 0,005 \text{sen} 200t$   
 $i = e^{-200t} (-\cos 400t + 5,5 \text{sen} 400t) - 2 \text{sen} 200t + \cos 200t$
4.  $x(t) = e^{-t} \left( -2 \cos 3t - \frac{2 \text{sen} 3t}{3} \right)$

## SISTEMAS DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

Chama-se sistema de equações diferenciais a um conjunto de equações diferenciais que tenham as mesmas funções incógnitas e que se verifiquem simultaneamente para as mesmas soluções.

Neste item iremos estudar somente os sistemas de equações diferenciais ordinárias de coeficientes constantes em que o número de equações seja igual ao número de funções incógnitas.

A resolução dos sistemas de equações diferenciais é análoga à resolução dos sistemas de equações algébricas lineares.

É sempre conveniente escrever o sistema em função do operador derivada  $D$ .

### EXERCÍCIOS:

Resolver os seguintes sistemas de equações diferenciais:

$$1. \begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dz}{dx} - y = e^x \\ \frac{dy}{dx} - \frac{d^2 z}{dx^2} - 2z = x^2 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} \frac{dx}{du} + 6x + 3y - 14z = 0 \\ \frac{dy}{du} - 4x - 3y + 8z = 0 \\ \frac{dz}{du} + 2x + y - 5z = \operatorname{senu} \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 2 \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} - 4y - z = e^x \\ \frac{dy}{dx} + 3y + z = 0 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} (D-3)y + 2(D+2)z = 2\operatorname{sen}x \\ 2(D+1)y + (D-1)z = \cos x \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dz}{dx} = x^2 \\ \frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dz}{dx} - 2y + z = x \end{cases}$$

$$6. x' = -3x + 2y, \quad y' = -3x + 4y, \quad \text{com } x=x(t), y=y(t), x(0)=0 \text{ e } y(0)=2$$

$$7. 2y' - x' = x + 3y + e^t, \quad 3x' - 4y' = x - 15y + e^{-t}$$

Respostas:

$$1) \begin{cases} z = Ae^{\sqrt{2}x} + Be^{-\sqrt{2}x} + C \cos x + D \operatorname{sen}x - \frac{e^x}{2} - \frac{x^2}{2} + \frac{3}{2} \\ y = 2\sqrt{2}Ae^{\sqrt{2}x} - 2\sqrt{2}Be^{-\sqrt{2}x} - C \cos x + D \operatorname{sen}x - \frac{3e^x}{2} + 2x \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x = Ae^u + Be^{2u} + Ce^{-u} - 5\text{senu} + \cos u \\ y = -\frac{Be^{-u}}{2} - \frac{4Ce^{2u}}{5} + \frac{12\text{senu}}{5} - \frac{4\cos u}{5} \\ z = \frac{Ae^u}{2} + \frac{Be^{-u}}{4} + \frac{2Ce^{2u}}{5} - \frac{17\text{senu}}{10} - \frac{\cos u}{10} \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} y = A\cos x + B\text{sen}x - \frac{e^x}{2} \\ z = -(3A + B)\cos x + (A - 3B)\text{sen}x + 2e^x \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} y = Ae^{-x/3} + Be^{-5x} + \frac{1}{65}(8\text{sen}x + \cos x) \\ z = Ae^{-x/3} - \frac{4Be^{-5x}}{3} - \frac{33\cos x}{130} + \frac{61\text{sen}x}{130} \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} z = A + Be^{2x} + Ce^{-3x} - \frac{x^3}{9} - \frac{x^2}{18} + \frac{11x}{54} \\ y = \frac{3Be^{2x}}{2} - Ce^{-3x} - \frac{x^3}{18} + \frac{11x^2}{36} \end{cases}$$

$$6) x = \frac{4}{5}(e^{3t} - e^{-2t}), \quad y = \frac{2}{5}(6e^{3t} - e^{-2t})$$

$$7) x = A\cos 3t + B\text{sen}3t - \frac{11e^t}{20} - \frac{e^{-t}}{4}, \quad y = \frac{1}{3}\{(A - B)\cos 3t + (A + B)\text{sen}3t\} + \frac{e^t}{10}$$

## EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS

### Conceitos:

São as equações diferenciais que possuem derivadas parciais de uma função de várias variáveis.

A maior ordem da derivada que aparece na equação diferencial é chamada de ordem da equação diferencial parcial.

Com respeito às soluções de uma equação diferencial parcial devemos citar as soluções: Solução geral que é aquela que possui funções arbitrárias, a solução completa que possui constantes arbitrárias e a solução singular que é a envoltória da família de superfícies correspondentes à solução completa.

Usualmente, nas equações diferenciais parciais que possuam derivadas parciais da função  $z=f(x,y)$ , denota-se  $\frac{\partial z}{\partial x} = p$  e  $\frac{\partial z}{\partial y} = q$ , ou seja, a equação  $zx\frac{\partial z}{\partial x} + yz\frac{\partial z}{\partial y} = 2xy$  pode ser escrita da forma  $zxp + yzq = 2xy$ .

As equações da forma  $P.p + Q.q = R$  são chamadas de equações lineares, onde  $P=P(x,y,z)$ ,  $Q=Q(x,y,z)$  e  $R=R(x,y,z)$

### Determinação da solução geral:

Nos casos particulares das equações lineares  $P.p + Q.q = R$ , onde  $P=0$  ou  $Q=0$  a solução geral é facilmente determinada por integração, vejamos os exemplos:

- a)  $\frac{\partial z}{\partial x} = 4x + y - 3$  terá solução geral  $z = 2x^2 + xy - 3x + f(y)$
- b)  $\frac{\partial z}{\partial y} = 4x + y - 3$  terá solução geral  $z = 4xy + \frac{y^2}{2} - 3y + f(x)$

### EXERCÍCIOS:

**Determine a solução geral das equações diferenciais parciais:**

1.  $x + yp = 0$
2.  $xp = x + 2y + 2z$
3.  $y - xq = 0$
4.  $xp - y = z - x$
5.  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 5\frac{\partial z}{\partial x} + 6z = 12x$
6.  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 4\frac{\partial z}{\partial x} - 5z = e^x$
7.  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x^2 + y^2$
8.  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2xy^2$

### Respostas:

1.  $z = -\frac{x^2}{2y} + \phi(y)$
2.  $z = x^2\phi(y) - x - y$
3.  $z = \frac{y^2}{2x} + \phi(x)$
4.  $z = x\left[-\frac{y}{x} - \ln x + \phi(x)\right]$
5.  $z = \phi_1(y).e^{2x} + \phi_2(y).e^{3x} + 2x + \frac{5}{3}$
6.  $z = \phi_1(y).e^{-x} + \phi_2(y).e^{5x} - \frac{e^x}{8}$
7.  $z = \frac{x^3 y}{3} + \frac{xy^3}{3} + \phi_1(x) + \phi_2(y)$
8.  $z = \frac{x^2 y^3}{3} + \phi_1(x) + \phi_2(y)$

Nos casos gerais poderemos empregar o método de Lagrange, que consiste na resolução do sistema  $\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}$ , cujas soluções são  $u=u(x,y,z)=a$  e  $v=v(x,y,z)=b$  e as relações  $\phi(u,v)=0$  ou  $u=\phi(v)$  ou ainda  $v=\phi(u)$  serão soluções gerais da equação diferencial linear, desde que pelo menos  $u$  ou  $v$  tenham a variável  $z$ .

### Exemplos:

**Determine a solução geral das seguintes equações diferenciais parciais:**

1)  $2px - 3qy = 2z$

Na comparação com a equação linear vemos que  $P = 2x$ ,  $Q = -3y$  e  $R = 2z$ , que substituído no sistema de Lagrange  $\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}$ , resulta  $\frac{dx}{2x} = \frac{dy}{-3y} = \frac{dz}{2z}$ .

De  $\frac{dx}{2x} = \frac{dy}{-3y}$  obtemos  $x^3 y^2 = a$  e de  $\frac{dy}{-3y} = \frac{dz}{2z}$  teremos  $z^3 y^2 = b$

Assim uma solução geral pode ser  $z^3 y^2 = \phi(x^3 y^2)$

2)  $yp + xq = 0$

Substituindo no sistema de Lagrange  $P = y$ ,  $Q = x$  e  $R = 0$ , teremos:

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{x} = \frac{dz}{0}$$

De  $\frac{dx}{y} = \frac{dy}{x}$  obtemos  $x^2 - y^2 = a$  e de  $\frac{dy}{x} = \frac{dz}{0}$  teremos  $z = b$ , logo:

$z = \phi(x^2 - y^2)$  é uma solução geral.

3)  $(x - y + x)p + (2y - z)q = z$

O sistema auxiliar é dado por  $\frac{dx}{x - y + z} = \frac{dy}{2y - z} = \frac{dz}{z}$

De  $\frac{dy}{2y - z} = \frac{dz}{z}$  vem a equação linear  $\frac{dy}{dz} - \frac{2y}{z} = -1$  cuja solução é  $\frac{y}{z^2} - \frac{1}{z} = a$

Para determinarmos uma segunda equação diferencial a partir do sistema auxiliar, vamos aplicar propriedades das proporções, assim:

$$\frac{dx}{x - y + z} = \frac{dy}{2y - z} = \frac{dz}{z} = \frac{dx + dy}{x - y + z + 2y - z} = \frac{d(x + y)}{x + y}, \text{ de onde obteremos:}$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{d(x + y)}{x + y}$$

$$\frac{z}{x + y} = b$$

Logo  $\frac{z}{x + y} = \phi\left(\frac{y}{z^2} - \frac{1}{z}\right)$  é uma solução geral.

## EXERCÍCIOS:

**Determine a solução geral das equações diferenciais parciais:**

1.  $2p + 3q = 1$

2.  $y^2 zp - x^2 zq = x^2 y$

3.  $x \frac{\partial z}{\partial t} + y \frac{\partial z}{\partial y} + t \frac{\partial z}{\partial t} = xyt$

4.  $p + q = z$

5.  $3p + 4q = 2$

6.  $-xp + yq = z$

7.  $xzp + yzq = xy$

8.  $x^2 p + y^2 q = z^2$

9.  $yp - xq = 2xyz$

10.  $p \cdot \text{sen} x + q \cdot \text{cos} x = 1$

11.  $\frac{y^3}{x^2} p + \frac{x^3}{y^2} q = z$

12.  $(x^2 + y^2)p + 2xyq = (x + y)^3 z$

## Respostas:

1.  $\phi(x - 2z, 3x - 2y) = 0$

2.  $y^2 + z^2 = \phi(x^3 + y^3)$

3.  $\phi(x/y, t/y, xyt - 3z) = 0$

4.  $z = e^y \phi(x - y)$

5.  $3z = 2x + \phi(3y - 4x)$

6.  $xz = \phi(xy)$

7.  $y = x\phi(xy - z^2)$

8.  $x - y = xy\phi(1/x - 1/z)$

9.  $z = e^{x^2} \cdot \phi(x^2 + y^2)$

10.  $\ln(\text{sen} x) - y = \phi\left[z - \ln\left(\text{tg} \frac{x}{2}\right)\right]$

$$11. \phi\left(\frac{x^3 + y^3}{z^3}, x^6 - y^6\right) = 0$$

$$12. (x + y)^2 - 2 \ln z = \phi\left(\frac{2x}{x^2 - y^2}\right)$$

### Determinação da solução completa – Método de Charpit:

Dada uma equação diferencial não linear  $f(x, y, z, p, q) = 0$  (1), com  $z$  uma função de  $x$  e  $y$ . O método de Charpit para a determinação da solução completa (1), consiste em encontrar uma equação  $F(x, y, z, p, q) = 0$  (2) tal que na resolução simultânea de (1) e (2) possamos determinar uma relação  $p = P(x, y, z)$  e  $q = Q(x, y, z)$  de modo que a diferencial total  $dz = p \cdot dx + q \cdot dy$  possa ser integrada. Para a obtenção de (2) deveremos resolver o sistema auxiliar:

$$\boxed{\begin{matrix} \frac{dx}{-\frac{\partial f}{\partial p}} = \frac{dy}{-\frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dp}{\frac{\partial f}{\partial x} + p \frac{\partial f}{\partial z}} = \frac{dq}{\frac{\partial f}{\partial y} + q \frac{\partial f}{\partial z}} = \frac{dz}{-\left(p \frac{\partial f}{\partial p} + q \frac{\partial f}{\partial q}\right)} = \frac{dF}{0} \end{matrix}} \quad (3)$$

### Exemplos:

#### Determine a solução completa das seguintes equações diferenciais parciais:

a)  $q = -xp + p^2$

A função  $f(x, y, z, p, q) = 0$  (1) é  $f = q + xp - p^2 = 0$  e substituída no sistema auxiliar nos fornece:

$$\frac{dx}{2p - x} = \frac{dy}{-1} = \frac{dp}{p} = \frac{dq}{0} = \frac{dz}{-px + 2p^2 - q} = \frac{dF}{0}$$

A partir de  $\frac{dy}{-1} = \frac{dp}{p}$  vem  $p = a \cdot e^{-y}$

Substituindo na equação diferencial dada implica em:

$$q = -xp + p^2 = -ax \cdot e^{-y} + a^2 e^{-2y}.$$

Substituindo  $p$  e  $q$  em  $dz = p \cdot dx + q \cdot dy$ , teremos:

$dz = a \cdot e^{-y} dx + (-ax \cdot e^{-y} + a^2 e^{-2y}) dy$ , que é uma diferencial exata, pois

$$\frac{\partial a \cdot e^{-y}}{\partial y} = \frac{\partial (-ax \cdot e^{-y} + a^2 e^{-2y})}{\partial x}, \text{ e integrada resulta em:}$$

$$z = ax \cdot e^{-y} - \frac{a^2 e^{-2y}}{2} + b, \text{ que é a solução completa.}$$

b)  $2p + q^3 - 3 = 0$

O sistema auxiliar será  $\frac{dx}{-2} = \frac{dy}{-2q} = \frac{dp}{0} = \frac{dq}{0} = \frac{dz}{-2p - 2q^2} = \frac{dF}{0}$  e da razão  $\frac{dp}{0}$  teremos

$p = a$ , que substituído na equação dada nos fornece  $q = \sqrt[3]{3 - 2a}$ .

Substituindo  $p$  e  $q$  em  $dz = p \cdot dx + q \cdot dy$ , teremos  $dz = a dx + \sqrt[3]{3 - 2a} dy$ .

Integrando a diferencial anterior teremos a solução completa:

$$z = ax + \sqrt[3]{3 - 2a} y + b$$

$$c) 2yp^2 + 5q = 0$$

O sistema auxiliar será  $\frac{dx}{-4yp} = \frac{dy}{-5} = \frac{dp}{0} = \frac{dq}{2q^2} = \frac{dz}{-4p^2y - 5q} = \frac{dF}{0}$  e da razão  $\frac{dp}{0}$  teremos

$p = a$ , que substituído na equação dada nos fornece  $q = \frac{-2a^2y}{5}$ , assim  $dz = a.dx - \frac{2a^2y}{5}dy$  nos

dará a solução completa  $z = ax - \frac{a^2y^2}{5} + b$ .

$$d) pq = z$$

$$\frac{dx}{-\frac{\partial f}{\partial p}} = \frac{dy}{-\frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dp}{\frac{\partial f}{\partial x} + p\frac{\partial f}{\partial z}} = \frac{dq}{\frac{\partial f}{\partial y} + q\frac{\partial f}{\partial z}} = \frac{dz}{-\left(p\frac{\partial f}{\partial p} + q\frac{\partial f}{\partial q}\right)} = \frac{dF}{0}$$

$$\frac{dx}{-q} = \frac{dy}{-p} = \frac{dp}{-p} = \frac{dq}{-q} = \frac{dz}{-2pq} = \frac{dF}{0}$$

$$\text{De } \frac{dp}{-p} = \frac{dq}{-q} \text{ vem } p = a.q$$

$$\text{Resolvendo } \begin{cases} p = aq \\ pq = z \end{cases} \text{ teremos:}$$

$$p = \sqrt{az} \text{ e } q = \sqrt{\frac{z}{a}} \text{ que substituído na diferencial } dz = p.dx + q.dy \text{ nos fornece}$$

$$\sqrt{az}dx + \sqrt{\frac{z}{a}}dy = dz, \text{ que integrado nos dará a solução completa } 2\sqrt{z} = \frac{ax+y}{\sqrt{a}} + b.$$

A aplicação do método de Charpit para determinadas formas de equações diferenciais parciais nos darão regras mais simplificadas para a obtenção da solução completa. Podemos citar os seguintes casos:

$$i. f(p, q) = 0$$

Uma solução completa é  $z = ax + by + c$ , onde  $f(p, q) = 0$  com  $a = p$  e  $b = q$ .

$$ii. f(x, p, q) = 0$$

Fazendo  $q = a$  em  $f(x, p, q) = 0$  determinaremos  $p = f_1(a, x)$ , que substituído em  $dz = p.dx + q.dy$  e integrado nos dará a solução completa  $z = \int f_1(a, x)dx + ay + b$ .

$$iii. f(y, p, q) = 0$$

Fazendo  $p = a$  em  $f(y, p, q) = 0$  determinaremos  $q = f_1(a, y)$ , que substituído em  $dz = p.dx + q.dy$  e integrado nos dará a solução completa  $z = ax + \int f_1(a, y)dy + b$ .

$$iv. f(z, p, q) = 0$$

A partir das equações auxiliares do método de Charpit teremos  $q = ap$  (1), assim a equação  $f(z, p, q) = 0$  ficará  $f(z, p, ap) = 0$  (2). A integração de  $dz = p.dx + q.dy$  após a substituição de  $q$  e  $p$ , das equações (1) e (2) anteriores, nos dará a solução completa.

v.  $z = px + qy + f(p, q)$

Uma solução completa tem a forma  $z = ax + by + c$ , com  $c = f(p, q)$ .

### EXERCÍCIOS:

Determine a solução completa das equações diferenciais parciais:

1.  $p^2 + q^2 = 9$

2.  $pq + p + q = 0$

3.  $z = px + qy + p^2 + pq + q^2$

4.  $z = px + qy + p^2q^2$

5.  $p^2 = 2qx$

6.  $p = q^2$

7.  $pq = 2p - q$

8.  $p = y^2q^2$

9.  $p + x = qy$

10.  $1 + p^2 = qz$

### Respostas:

1.  $z = ax + \sqrt{9 - a^2}y + b$

2.  $z = ax - \frac{a}{a+1}y + b$

3.  $z = ax + by + c$ , onde  $c = a^2 + b^2 + ab$

4.  $z = ax + by + a^2b^2$

5.  $z = \pm \frac{2}{3}\sqrt{2a}x^{3/2} + ay + b$

10.  $a^2z^2 + az\sqrt{a^2z^2 - 4} - 4\ln(az + \sqrt{a^2z^2 - 4}) = 4a(x + ay + b)$

6.  $z = a^2x + ay + b$

7.  $z = ax + \frac{2ay}{a+1} + b$

8.  $z = ax \pm \sqrt{a} \ln y + b$

9.  $z = ax - \frac{x^2}{2} + a \ln y + b$

### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ABUNAHMAN, Sérgio A. *Equações diferenciais*. São Paulo: LTCE.

AYRES Jr, Frank. *Equações diferenciais*. Rio de Janeiro: McGraw-Hill do Brasil, 1970.

EDWARDS Jr, C. H. *Equações diferenciais elementares com problemas de contorno*. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1995.

ZILL, Dennis G. *Equações diferenciais com aplicações em modelagem*. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2003.